



# メロン編



病害虫注意報  
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

立春を迎え外気温が高くなってきました。  
害虫の飛込みが増加し、曇雨天時が続くと  
つる枯病も発生しやすい時期です！



## つる枯病・アブラムシに注意

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	ミツバチ
①	つる枯病・疫病・炭疽病 べと病・斑点細菌病	ジマンダイセン水和剤	400~600倍	7日前	5回	3日
	アブラムシ類・ハダニ類 コナジラミ類・うどんこ病	サンマイトフロアブル	1000~1500倍	3日前	2回	4日
②	菌核病	ベンレート水和剤	2000~3000倍	前日	3回	1日
	アブラムシ類・コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ ウリノメイガ	バリアード顆粒水和剤	2000~4000倍 ※アブラムシ類4000倍、ウリノメイガ2000倍	前日	3回	1日
③	つる枯病・うどんこ病	ベルコート水和剤	1000倍	前日	5回	0日
	アブラムシ類・コナジラミ類	ウララDF	2000~4000倍 ※コナジラミ類は2000倍	前日	2回	0日
④	つる枯病・うどんこ病 アザミウマ類・ハダニ類	ポリオキシシンAL水溶剤	1000~2000倍 ※アザミウマ類・ハダニ類は2000倍	前日	5回	3日
	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類	ベストガード水溶剤	1000~2000倍	7日前	3回	6日

## うどんこ病・ハダニにも注意！

ミツバチ0日：薬散後十分乾けば導入可能

- うどんこ病  
 ・アフェットフロアブル 2,000~4,000倍 前日/3回  
 ・パンチョTF顆粒水和剤 2,000倍 前日/2回
- ハダニ類  
 ・ダブルフェースフロアブル 2,000倍 前日/1回(ハチ1日)  
 ・カネマイトフロアブル 1,000~1,500倍 前日/1回(ハチ0日)

## つる枯れ病が出てしまったら、塗布剤が効果的です

### トップジンMペースト

原液を塗布  
(21日前/1回)



### ポリオキシシンAL水溶剤

10~50倍液を塗布  
(7日前/1回) 散布と合わせて5回以内



## おすすめ情報

# フーモン

(ポリグリセリル脂肪酸エステル乳剤)

- ★ 1,000倍の高希釈倍率で野菜類に使用できます。
- ★ 有効成分がすばやく害虫を包囲し、気門封鎖で窒息死させます。

適用害虫：アブラムシ類・ハダニ類・コナジラミ類・うどんこ病  
倍率/時期：1000倍/収穫前日/回数制限無し

※果実に使用する際は、注意してください。

