



スイカ編



病害虫注意報
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

つる枯病、アブラムシの発生に注意！

今月のおすすめローテーション

交配後2週間は農薬
散布を避けましょう！

つる枯病・疫病
炭疽病・べと病
褐斑細菌病
アブラムシ類
ハダニ類・コナジラミ類
うどんこ病

ジマンダイセン水和剤 400~600倍 7日前/7回 (ミツバチ3日) 予
サンマイルフロアブル 1000~1500倍 3日前/2回 (ミツバチ4日)

炭疽病
褐色腐敗病
つる枯病
アブラムシ類
ミナキイロアザミウマ
コナジラミ類

フォリオゴールド 800~1000倍 予・治
7日前/3回
炭疽病、つる枯病は800倍
ベストガード水溶剤 1000~2000倍
7日前/3回 (ミツバチ6日)

つる枯病
炭疽病
菌核病
アブラムシ類

ベンレート水和剤 予・治
2000~3000倍 前日/5回 (ミツバチ1日)
ウララDF 2000~4000倍
前日/2回 (ミツバチ0日)

つる枯病
うどんこ病
炭疽病・菌核病
ハダニ類・コナジラミ類
アザミウマ類・アブラムシ類

ベルコート水和剤 1000倍 前日/4回 (ミツバチ0日) 予
モベントフロアブル 2000倍 前日/3回 (ミツバチ1日)

ハダニ、うどんこ病おススメ薬剤

ハダニ類
ダブルフェースフロアブル 2000倍 前日/1回 (ミツバチ1日)
アグリメック 500~1000倍 前日/3回 (ミツバチ14日)

うどんこ病
ガッテン乳剤 5000倍 前日/2回
パンチョTF顆粒水和剤 2000倍 前日/2回
シグナムWDG 1500~2000倍 前日/3回

おすすめ資材

ファイトカルリニューアルしました!



★グリシンベタイン 新配合★

優れた展着性と浸透性

トレハロースや有機酸に加え、新配合のグリシンベタインでカルシウムがキレート化され、浸透性や移動性が向上しています！

注意!

以下のものとは混用できません!!

ストロビルリン系(アミスター、ストロビー、シグナムなど)、無機銅(カッパーシン、Zボルドーなど)、フルジオキシソニル(セイビアー)、ホルモン剤、微量要素入り葉面散布剤、液肥類

新規登録 平成29年4月

プロパティフロアブル

3,000~4,000倍 収穫前日/3回
うどんこ病 ミツバチ影響なし
附着器や孢子の形成、菌糸の伸長を阻害
マルチスプレッド効果で成分が速やかに拡散



新規登録 平成29年4月

アニキ乳剤

1,000倍 収穫前日/3回
オオタバコガ ミツバチ1日
有効成分:レピメクチン
抑制神経系に作用、速効性に優れる

