



イチゴ編



病害虫注意報
2017年9月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

定植前に徹底防除を行い 年内の病害虫発生を抑えましょう！

育苗～本圃定植時 おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数				
						ミツバチ	マルハナバチ	刊	ミコ	
9月 ①	炭疽病 うどんこ病	バルクト水和剤	予	1,000倍	育苗期	5回 ※育苗期	0日	0日	0日	
	ハダニ類・コナジラミ類 ワタアブラムシ・チャノコリダニ シラメコリダニ	サンライフロアブル	中卵 成虫 幼虫	1,000～ 1,500倍	収穫開始 3日前まで	1回	4日	1～4日	30日	
9月 ②	炭疽病	ゲッター水和剤	治	1,000倍	収穫開始 21日前まで	3回	0日	1日	14日	
	ハダニ類・アブラムシ類 コナジラミ類・うどんこ病	フーエン ※ 野菜類登録	速 成虫 幼虫	1,000倍	前日	—	1日		1日	
9月 ③	炭疽病・芽枯病 灰色かび病	ホーサイト水和剤80	予	800倍	30日前	3回	1日	0日	0日	
	ハダニ類	ダブルフェース フロアブル	速卵 成虫 幼虫	2,000倍	前日	1回	1日	1日	14日 以上	14日
定植前	ハダニ類・アザミウマ類 コナジラミ類・アブラムシ類	イベントフロアブル ※ 下記参照	遅 幼虫	500倍	育苗期後半	灌注 1回	0日	45日	45日	
9月 ④	うどんこ病 灰色かび病 ハダニ類	ホリチンAL水溶剤	予・治 幼虫	5,000倍	収穫開始 14日前まで	3回	3日	0日	14日	
	ハダニ類・ハスモントウ ミカンキロアザミウマ シラメコリダニ	コテツフロアブル	速卵 成虫 幼虫	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

定植前のハダニ対策に！

イベントフロアブル

対象病害；ハダニ類、アザミウマ類、
コナジラミ類、アブラムシ類
育苗期後半／1回
500倍、25～50mL/株
ハダニ類・アザミウマ類は50mL/株
灌注処理



定植時のどぶ漬け処理がおすすめ！

500～1,000倍で浸漬

ファイトオーツ

肥料登録：
生第83241号



苗の活着改良、毛細根の充実に！

100～150g/10aを灌水処理
10～14日おきに3～4回

ファイトメット

肥料登録：
生第84050号

