



キク編



病害虫注意報
2017年9月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**涼しくなるとアザミウマの発生が再び増加します。
ハダニ類・オオタバコガ・ハスモンヨトウも引き続き発生します！**

アザミウマ類は、夏の時期は暑さによって一旦少なくなります、涼しくなると増加します。また、併せてえそ病・茎えそ病も増える可能性があります。またハダニ類の発生が多くなっています。防除を徹底しましょう。また、**白さび病の防除を止めていた方も、予防散布を開始してください！**

今月のおすすすめローテーション

定植後


ミカンキイロアザミウマ、 マメハモグリバエ、 アブラムシ類	ベストガード粒剤	2g/株 生育期株元散布 発生初期/4回 (アブラムシ類は1~2g/株)
-------------------------------------	----------	--

アザミウマ類 オオタバコガ	プリンスフロアブル	2,000倍 発生初期/5回
------------------	-----------	----------------

生育初期

ハダニ類	ダブルフェイスフロアブル	2,000倍 発生初期/1回
------	--------------	----------------

さび病、灰色かび病、 炭疽病、べと病	エムダイファー水和剤	400~650倍 発病初期/8回
-----------------------	------------	---------------------



破蕾期

アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ	スピノエース 顆粒水和剤	5,000倍 発生初期/2回 (オオタバコガは 2,500~5,000倍)
-----------------------------	-----------------	--

ハダニ類	カネマイト フロアブル	1,000~1,500倍 -/1回
------	----------------	----------------------

消灯時

ミカンキイロアザミウマ、 マメハモグリバエ、 ハスモンヨトウ	マッチ乳剤	1,000倍 発生初期/5回 (ハスモンヨトウ2,000倍)
--------------------------------------	-------	--------------------------------------

ミカンキイロアザミウマ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍 発生初期/5回
-------------	--------	-------------------------

ハダニ類	ペンタック 水和剤(施設栽培)	1,000倍 -/
------	--------------------	--------------

発蕾期

オオタバコガ、ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍 発生初期/6回 (マメハモグリバエは1000倍)
----------------------------	-------	--

カメムシ類、ハモグリバエ類 アブラムシ類、アザミウマ類、 ナメコバエ	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍 発生初期/4回 (アブラムシ類、アザミウマ類、 ナメコバエは4,000倍株元灌注)
--	---------	--

白さび病、うどんこ病	アンビルフロアブル	1,000倍 発病初期/7回
------------	-----------	----------------



おすすすめ資材



マグネシウムの補給と
光合成の促進、葉色UPに！

**ファイトマジック
1,000倍**

肥料登録：生第87201号



樹勢維持と
弱った株の回復に！

**カテキンパワー
1,000倍**

肥料登録：生第91402号

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますので、ご注意ください。さらに、展着剤、葉面散布剤などを加用する場合も、ご注意ください。