



レタス編



病害虫注意報
2017年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫
注意！

ハスモンヨトウ・オオタバコガ

老齢幼虫は薬剤が効きにくく、防除が難しくなります。
定期防除と幼虫を見かけたら早めの防除を心がけましょう！



病害注意！

すそ枯病・斑点細菌病

曇天が続いたり、突然の大雨などが多くなります。
病気の発生前にしっかり防除することを心がけましょう！



アブラムシ
注意！

アブラムシ

秋口に発生することがあります。新芽などをよく観察しましょう！
特に育苗期にアブラムシ剤を使用していない場合は発生に注意！



定植後～おすすめ防除体系

定植 10日後 20日後 30日後

キノドーフロアブル 800～1000倍

(収穫21日前まで/5回)
軟腐病・斑点細菌病・腐敗病

アニキ乳剤

1000～2000倍

(収穫3日前まで/3回)
オオタバコガ・ハスモンヨトウ

ダコニール1000 1000倍

(収穫14日前まで/3回)
すそ枯病・べと病

トルネードエースDF

2000倍

(収穫7日前まで/2回)
オオタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ

バリダシン液剤5 800倍

(収穫7日前まで/3回)
すそ枯病・軟腐病・腐敗病
フェニックス顆粒水和剤

2000～4000倍

(収穫前日まで/2回)
ウワバ類・オオタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ

【アブラムシの発生がある場合】

ランネート45DF

1000～2000倍

(収穫21日前まで/2回)

【アブラムシの発生がある場合】

ウララDF

2000倍

(収穫前日まで/2回)

【アブラムシの発生がある場合】

モスピラン顆粒水溶剤

2000～4000倍

(収穫前日まで/3回)

おすすめ資材

ファイトオーツー
1000倍



葉面散布

+



カテキンパワー
1000倍

農薬に混ぜて洗い流すように散布すると効果的！

(但し、カテキンパワーと上記薬剤ではキノドーフとバリダシンは混用不可)