



キャベツ編



病害虫注意報
2018年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナガ・シロイチモジヨトウ対策

コナガ



初め、薄皮が残して食害する
激発時は葉表・葉脈を残すように食害する
幼虫は葉裏で蛹になる。

シロイチモジヨトウ



幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
幼虫は食欲旺盛、狭い場所を好み新葉に入っている場合もある
成虫は暗灰褐色の小型の蛾である

【おすすめ防除ローテーション】

※シロイチモジヨトウに対しては弊社独自の試験結果より、他害虫との同時防除でも効果が高いと推定される薬剤を選択しています

タマギンウバ・コナガ・ハイマダラノメイガ
ヨウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ

アフーム乳剤 1000～2000倍／収穫前日まで／3回以内

コナガ・アオムシ

トルネードエースDF 1000～2000倍／収穫7日前まで／2回以内

アオムシ・コナガ
オオタバコガ・ハイマダラノメイガ

チューンアップ顆粒水和剤 2000～3000倍／発生初期、但し収穫前日まで／－
※野菜類登録

アオムシ・コナガ・ハイマダラノメイガ
アブラムシ類・ナメクジ類

リーフガード顆粒水和剤 1500倍／収穫7日前まで／3回以内
※定植後2週間程度までは薬害の恐れがあるため、使用は避ける

ウバ類・コナガ・ハスモンヨトウ・アオムシ
ハイマダラノメイガ・オオタバコガ・ヨウムシ

ディアナSC 2500～5000倍／収穫前日まで／2回以内

ウバ類・コナガ・ハイマダラノメイガ
ヨウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ・オオタバコガ

フェニックス顆粒水和剤 2000～4000倍／収穫前日まで／3回以内

アオムシ・コナガ

フローバックDF 1000～2000倍／発生初期、但し収穫前日まで／－
※野菜類登録

おすすめ資材

1000倍



ファイトカル

雨が少ない年はカルシウム欠乏に注意!!

カルシウムは移行性が低いので、定期的に補給して下さい

但し、浸透剤加用で薬害発生の恐れのある農薬(アミスター等)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用は出来ません