



スイートコーン編



病害虫注意報
2018年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫特集

雄穂



雌穂

オオタバコガやアワノメイガは、中に潜り込んだら防除が困難です。穂が出始める頃から注意し、タイミング良く防除しましょう！

【防除適期】

第一防除期：雄穂の先端がわずかに出だした頃

第二防除期：穂先出始めから1週間後

第三防除期：受粉終了後、雄穂を切り取った直後

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。

<チョウ目害虫の主な防除薬>

薬剤名	希釈倍率	日数/回数	適用病害虫	ヤングコーンでの使用
アニキ乳剤	1000倍	前日/3回	オオタバコガ	○ 前日/3回
アフーム乳剤	1000~2000倍	3日前/2回	オオタバコガ、ヨトウムシ	○ 前日/2回
カスケード乳剤	2000~4000倍	7日前/2回	アワノメイガ、オオタバコガ (4000倍)	×
コテツフロアブル	2000倍	前日/2回	オオタバコガ、ハダニ類	○ 前日/2回
ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	前日/-	オオタバコガ	○ 前日/- (野菜類登録)
プレバソソフロアブル5	2000倍	前日/3回	アワノメイガ、オオタバコガ	×
フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	前日/2回	アワノメイガ、オオタバコガ	○ 前日/2回
プレオフロアブル	1000倍	前日/2回	オオタバコガ	×
粒剤 パダン粒剤4	6kg/10a 株の上から均一に撒粒する。	7日前/2回	アワノメイガ	×

登録内容 再確認

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

スイートコーン
とうもろこし登録もしくは
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ヘビーコーン
ヤングコーン登録もしくは
野菜類登録

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ず どちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

新規登録薬剤

2018年3月30日付で、
とうもろこしに登録！

アクセルフロアブル

1000~2000倍
アワノメイガ

前日/3回
100~300L/10a

- ・新しい化学構造の殺虫剤。
- ・大型チョウ目にも高い効果！
- ・浸透移行性は無いので、丁寧に散布して下さい。

※ヤングコーン登録はありません。

