



トマト編



病害虫注意報
2018年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

黄化葉巻病(TYLCV)特集



芽先が黄化・葉巻症状になり、節間がつまる。



タバココナジラミ幼虫



タバココナジラミ成虫

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、コナジラミ類の飛び込みが増えます。コナジラミによる黄化葉巻病の発生が多くなる時期ですので注意しましょう！

発病株全体にウイルスが広がっています。芽先をピンチするだけでは新たな保毒虫が増えるため、被害が拡大します！

黄化葉巻病感染株は株ごと
早急に除去しましょう！！

★タバココナジラミ(バイotype B,Q)によって媒介されるのでコナジラミ類の防除を徹底しましょう！

今月のおすすめコナジラミ類・灰色かび病 防除ローテーション

薬害回避のために、高温時・多湿時の散布は控え、夕方までにきちんと乾かしましょう！

コナジラミ類 アザミワ類 ハゲリバエ類 ハセンヨトウ オオバコガ	ディアナSC 2,500~5,000倍 前日/2回 1日 ※コナジラミ類は2,500倍
灰色かび病	【予】セイブーフロアブル20 1,000~1,500倍/散布 前日/3回

コナジラミ類 トマトヒゲニ モンキイロアザミワ ハセンヨトウ ハゲリバエ類 オオバコガ	アニキ乳剤 1,000~2,000倍 前日/3回 1日 ※トマトヒゲニ、ハゲリバエ類、ハセンヨトウ、 オオバコガは2,000倍
葉かび病・菌核病 灰色かび病	【予・治】カンタスドライフロアブル 1,000~1,500倍 (前日/3回)

コナジラミ類 アザミワ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍/散布 前日/3回 1日
菌核病 葉かび病 灰色かび病	【予・治】ゲッター水和剤 1,000~1,500倍/散布 前日/5回 1日 ※総使用回数に注意！

適用拡大情報

2018年3月30日
適用拡大！

アグリメック

他系統の殺虫剤に抵抗性をもつ害虫の同時防除が可能！



【登録内容】
コナジラミ類、トマトヒゲニ
トマトハゲリバエ、アザミワ類
500~1,000倍
100~300L/10a 散布
収穫前日/3回

マルチバチ影響日数7日

ミトマ登録なし

アクセルフロアブル

◆新しい化学構造の殺虫剤
◆既存剤抵抗性害虫にも有効！



【登録内容】
オオバコガ、ハセンヨトウ
1,000~2,000倍
100~300L/10a 散布
収穫前日/3回

マルチバチ影響日数8日

ガッテン乳剤

◆新規構造・新規作用
◆残効性にも優れる！



【登録内容】
うどんこ病

5,000倍
100~300L/10a 散布
収穫前日/2回