



キク編



病害虫注意報
2018年8月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

高温期です！この時期は立枯れ症状、ハスモンヨトウ、オオタバコガにご注意ください！

オオタバコガは生長点を食害するため、出荷できなくなります。成長すると芽に潜り薬剤の効果が低下するため、若齢幼虫期の防除を徹底しましょう！


また先月に引き続きハダニ類、アザミウマ類も発生しますので定期的な薬剤防除を行いましょう。立枯れ対策には定植前の粒剤、もしくは薬剤の灌注を行いましょう ※先月号ご参照ください。



今月のおすすめローテーション

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては葉害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

定植時	立枯病 (リゾク菌)	ユニフォーム粒剤	18kg/10a 土壌表面散布 定植時または生育期/3回
	アザミウマ類	プリンス粒剤	6kg/10a 植溝土壌混和 定植前/1回 ※総回数注意
生育初期	ミカンイロアザミウマ、ヨトウムシ類 ミナミイロアザミウマ、ハダニ類 オオタバコガ、アザミウマ類	コテツフロアブル	2,000倍 発生初期/2回
	ハダニ類	ニッソラン水和剤	2,000~3,000倍 -/2回



破蕾期	アブラムシ類	ウララ50DF	5,000~10,000倍 発生初期/6回	消灯時	オオタバコガ ハスモンヨトウ	フェニックス 顆粒水和剤	2,000~4,000倍 発生初期/4回 ※オオタバコガは2,000倍
	ミカンイロアザミウマ ハダニ類	アグリメック	500倍 発生初期/5回		ハダニ類	ダニコング フロアブル	2,000倍 発生初期/1回

※白さび病の出やすい圃場には、**リカト乳剤**や**ムダイア**等の殺菌剤を定期的に散布することをおすすめします！

発蕾期	ハダニ類	カネマイトフロアブル	1,000~1,500倍 -/1回
	ハメグリハダニ類、コナジラミ類 オオタバコガ、アザミウマ類	ディアナSC	2,500~5,000倍 発生初期/2回 ※コナジラミ類2,500倍
	アブラムシ類、コナジラミ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍 発生初期/4回

ファイトカル

優れた展着性と浸透性
葉やけ防止に！

グリシンベタイン新配合！

1,000倍
葉面散布



カテキンパワー

茶葉から抽出した植物活力資材
高温による穂や苗の腐りや
草勢維持におすすめ！

1,000倍
葉面散布もしくは
どぶ漬け時に



登録適用拡大情報

2018.6.13

ダニコングフロアブル

花卉類・観葉植物
ハダニ類
2,000倍 100~300L/10a
発生初期/1回

