



キク編



病害虫注意報
2019年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病、ハダニの発生に注意しましょう！

白さび病、ハダニに引き続き注意してください。白さび病は過湿、ハダニは乾燥と異なる環境で発生しやすくなります。また、親株は株が混み合うため、防除が難しくなります。定期的に防除し、健全な穂で栽培がスタートできるようにしっかり管理をお願いします。

今月のおすすめローテーション



※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

生育初期	アブラムシ類、アザミウマ類、 フーバラソウムシ、ハダニ類	トクチオン乳剤	1,000倍 発生初期/5回
	ハダニ類	テデオロン乳剤*	500~1,000倍 - / -
	白さび病	ジマンダイセンフロアブル	500~800倍 発生初期/8回



破蕾期	ハダニ類	スターマイト フロアブル	2,000倍 発生初期/1回	消灯時	ハダニ類	ダニサラバ フロアブル*	1,000倍 発生初期/2回
	コナジラミ類、アザミウマ類、 ハダニ類、ハダニ類、 オオカマキリ類、 オオカマキリ類	ディアナSC*	2,500~5,000倍 発生初期/2回 コナジラミ類 2,500倍		アブラムシ類 アザミウマ類	アドマイヤー フロアブル	2,000倍 発生初期/5回
	白さび病、*黒斑病、 *うどんこ病、*灰色かび病、 *ハダニ類	ポリオキシ AL水溶剤	2,500倍 発病初期/8回		白さび病、 うどんこ病、 アブラムシ類	ピリカット 乳剤	白さび病、アブラムシ類 1,000倍 うどんこ病 2,000倍 発生・発病初期/6回



発蕾期	アブラムシ類、ハダニ類	ロディー乳剤*	1,000倍 -/6回
	白さび病	Inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回

予防効果に優れています。
発蕾以降、夜間管理温度を
下げような場合お勧めです。

* 花き類・観葉植物登録

樹勢が弱い…。そんな時には

ファイトメット

「酵母由来のアミノ酸」や「キトサンオリゴ糖」
「メチオニン」が根を直接刺激して毛細根を
充実させます！



肥料登録：
生第84050号

10a当たり150~300gを
灌水処理（顆粒タイプ）

◆◆新年のご挨拶◆◆ 2019年

あけましておめでとうございます。
本年も皆様の作物の健康をお守りするため、
病害虫等に関する情報をお届けします。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

