



# レタス編



病害虫注意報  
2019年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害に注意!

## べと病

*Bremia lactucae*

- 葉脈に区切られた黄斑が発生し、葉裏に霜状のかびを生じる
- 低温期の多雨で発生する
- 組織内で菌糸または卵胞子の形で越冬する

## 灰色かび病

*Botrytis cinerea*

- 外葉基部や凍寒害による傷から菌が入りやすい
- 外葉の葉柄・葉身に水浸状の病斑ができ、灰色のビロード状のかびを生じる
- 低温多湿で発生する
- 被害残渣とともに菌糸で土中に越冬する

## 菌核病

*Sclerotinia sclerotiorum*

- 株元から腐敗し始めて、白いカビを生ずる
- ネズミの糞状の菌核を形成して土壌中で数年生存する。
- 多湿条件で多発する

### 《べと病・灰色かび病・菌核病のおすすめ薬剤》

注: 非結球レタス類は登録内容をご確認後、使用して下さい。

薬剤名	効果	使用量・方法	時期・回数	適用病害	非結球レタスの登録【注】
ピシロックフロアブル	予防	1,000倍	前日・3回	べと病	あり
アミスター20 フロアブル	予・治	2,000倍	7日前・4回	べと病・灰色かび病・ 菌核病・すそ枯病	あり ※すそ枯病の 適用無し
シグナムWDG	予・治	1,500~2,000倍 (べと病以外は1,500倍)	14日前・ 併せて1回	べと病・灰色かび病・ 菌核病・すそ枯病	あり
カンタス ドライフロアブル	予・治	1,000~1,500倍		灰色かび病・菌核病	あり
アフエットフロアブル	予防	2,000倍	前日・3回	灰色かび病・菌核病・ すそ枯病	あり
ファンタジスタ 顆粒水和剤	予・治	2,000~3,000倍	3日前・3回 (非結球は14日前)	灰色かび病・菌核病	あり
トップジンM水和剤	予・治	1,500~2,000倍 (すそ枯病は1,500倍)	7日前・2回 (非結球は21日前)	灰色かび病・菌核病・ すそ枯病	あり ※すそ枯病の 適用無し
オルフィンフロアブル	予・治	2000~3000倍	7日前・1回 (リーフレタスは 14日前)	灰色かび病・菌核病	リーフレタス
スクレアフロアブル	予・治	2000倍	前日・3回	菌核病	あり

乾燥する時期にプラス

## ファイトカル

1000倍

展着剤代わりに！(優れた展着性と浸透性)  
チップバーン予防！(素早くカルシウムを補給)  
凍寒害から植物を守る！(トレハロース配合)



生第83188号

## 農薬登録変更情報

### オルフィンフロアブル

収穫14日前→7日前  
へ登録変更になりました。  
(2018年9月12日付け)

リーフレタスは14日前のままです

※ラベル主義に基づきますが、変更の周知をお願いします。

◆◆新年のご挨拶◆◆

あけまして  
おめでとうございます

本年も皆様の作物の健康を  
お守りするため、病害虫や農業に  
関する情報をお届け致します。本  
年もどうぞよろしくお願ひ致します。

