



# ミニトマト編



病害虫注意報  
2019年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## トマトサビダニ特集 **このような症状に注意!**

極めて微小で、目には見えない害虫です。気象条件も良く、生育が旺盛になり作業管理に追われるこの時期によく目にします。発生に注意して予防散布を心がけていきましょう!

温度	発育日数(日)		
	卵	幼虫~若虫	合計
15℃	8.3	8.8	17.1
25℃	3.1	2.4	<b>5.5</b>
30℃	2.2	2.4	<b>4.6</b>

25℃では、卵の比率は約7割で、約25日の寿命中に1羽あたり約50卵産みます!



くすんだ褐色の茎→

たった5日で卵~成虫に!

## 今月のおすすめ防除ローテーション

コナジラミ類 トマトサビダニ  
ミカンアザミウマ  
ハスモントウ オオハコガ  
マメハダカクハエ トマトハダカクハエ

カスケード乳剤

2,000~4,000倍 前日/2回 毎2日  
※コナジラミ類・トマトサビダニ 4,000倍  
ミカンアザミウマ トマトハダカクハエは2,000倍

コナジラミ類  
トマトサビダニ  
ハダカクハエ類

コロマイト乳剤  
1,500倍 前日/2回 毎1日

トマトサビダニ  
ハダカクハエ類

マイトコーネフロアブル  
1,000倍 前日/1回 毎1日

コナジラミ類  
ハダカクハエ類 アブラムシ類  
うどんこ病

フーモン 1,000倍 前日/-回 毎1日

暖かくなり、コナジラミ類等の害虫の活動も活発になります。早めの対策を行っていきましょう!

### おすすめ葉面散布

# アミノ☆サンバ

1000倍

- ・ストレスに対する抵抗力の増強 (日照不足、低温、高温、環境ストレス)
  - ・サイズや色つやの向上
  - ・根張り向上
  - ・病害に対する抵抗性向上
- 酵素の力で植物元気!**

### 新規登録情報

# パルミノ

うどんこ病・コナジラミ類・トマトサビダニ  
2,000倍 収穫前日まで  
5回以内 クロマルハナバチ1日

モレスタンのフロアブル!  
薬害や汚れが出にくくなりました!



モレスタンとの回数に注意