



# メロン編



病害虫注意報  
2019年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 交配前おすすめローテーション

外気温度がだんだんと高くなってきています。  
害虫の飛込みが増加し、曇雨天が続くと  
つる枯病も発生しやすい時期です！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	ミツバチ
1	つる枯病、陥没病	予・治 トップジンM水和剤	1,500~2,000	前日	3回	なし
	アザミウマ類、ハダニ類 コナジラミ類	速 アグリメック	500~1,000	前日	3回	14日
2	つる枯病 うどんこ病	予 ネクスターフロアブル	1,000	前日	3回	なし
	ハダニ類、コナジラミ類 アブラムシ類、アザミウマ類	遅 モベントフロアブル	2,000	前日	3回	1日
3	うどんこ病、つる枯病 アザミウマ類、ハダニ類	予・治 ポリオキシシンAL水溶剤	1,000~2,000	前日	5回	3日
	アブラムシ類、コナジラミ類 ミミキ10アザミウマ ウリメカガ	中 バリアード顆粒水和剤	2,000~4,000	前日	3回	1日
4	うどんこ病、つる枯病	予・治 スコア顆粒水和剤	2,000	前日	3回	1日
	アブラムシ類、コナジラミ類	遅 ウララDF	2,000~4,000	前日	2回	1日

※アザミウマ類、ハダニ類は2,000倍  
※アブラムシは4,000倍、ウリメカガは2,000倍  
※コナジラミ類は2,000倍

## つる枯病にご注意ください！

★こんな症状出ていませんか？

- ①葉が褐変し、表面に小黑点がある
- ②地際部やつるの一部が褐変している



もしも発生してしまったら  
塗布剤が効果的です！

### トップジンM ペースト

原液を塗布  
(発病初期/1回)  
※収穫21日前



### ポリオキシシン AL水溶剤

10~50倍液を塗布  
(7日前/1回)  
※散布と合わせて5回以内



曇天・降雨が続くと  
つる枯病が発生しやすくなります！

新規登録薬剤です!!

## グレースシア 乳剤



幅広い害虫に速く効きます！  
新規有効成分が抵抗性害虫にも  
高い効果を示します!!

【登録内容】

コナジラミ類・ハダニ類  
アザミウマ類・ウリメカガ  
2,000倍/収穫前日  
2回以内 1日