スイートコーン編

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害虫注意報
2019年6月作成

アブラムシの発生に注意！

アブラムシは単為生殖（クローン）なので、１頭でも多量に増殖してしまいます。

収穫前のアブラムシ防除がとても重要です！



気温が上がり（12℃前後）密度が高くなると･･･。

交尾しなくても幼虫を増やせる･･･（クローン）

今月もチョウ目害虫の発生に注意しましょう！

▼とうもろこしを食害するチョウ目害虫の特徴

害虫名	主な食害部	発生回数/年	体長（老齢幼虫）
アワノメイガ	茎・雄穂・雌穂・子実	3回程度	約25 mm
アワヨトウ	葉（中肋を残す）・子実	3～4回程度	約35 mm
オオタバコガ	雄穂・雌穂・絹糸・子実	2～3回程度	約40 mm

▼ 収穫の１週間前に使用できるアブラムシ・チョウ目害虫防除剤

	薬剤名	稀釈倍率	収穫前／回数	アブラムシ類	チョウ目	ﾔﾝｸﾞｺｰﾝでの使用
散布剤	アグロスリン乳剤	1000～2000倍	7日前／3回	○ 2000倍	ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ、ｱﾜﾖﾄｳ （1000倍）	×
	モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	前日／3回	○		○ 2000倍 前日/2回
	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	3日前／3回	○		×
	コルト顆粒水和剤	4000倍	前日／3回	○		×
	アニキ乳剤	1000倍	前日／3回		ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ	○ 前日/3回
	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	前日／2回		ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ、ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ	○ 前日/2回
	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	前日／－		ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ	○ 前日/－ （野菜類登録）
粒剤	パダン粒剤４	6kg／10a	7日前／2回		ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ	×

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。