



ミニトマト編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2019年6月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

栽培終了時の残渣処理特集


ハウス外に出た害虫は露地で繁殖して再び次作で飛来・侵入してきてしまいます！

コナジラミを外に出さないためには・・・

- ①ハウスを1～2週間締切、ハウス内の温度を50℃以上に上げて蒸し込む
※温度を上げ過ぎると塩ビ管の糊が溶けたり、資材が変形する恐れがあります。
- ②有効薬剤を散布し、虫を死滅させた後に残渣を外へ出す


持ち出し前のおすすめ薬剤

モベントフロアブル 2,000倍 前日/3回
+ベストガード水溶剤 1,000～2,000倍 前日/3回



土壌消毒のポイント

- ①砕土を丁寧に行う
・・・固まっている土の内部は消毒されません！
- ②被覆を必ず行う
・・・被覆を行わないと薬剤が抜けやすくなり、表層しか消毒できません！



コナジラミ類蔓延防止・古株枯死に

キルパー 40～60L/10a

水溶液なので水に希釈でき、
土などに流すとガスが発生！

- ①灌水チューブによる灌水処理
(50～100倍程度)
- ②処理後は速やかにハウスを締め切り3～7日間放置して下さい。
- ③ガスを感じなくなったら片付け開始です。
- ④培地のガス抜けを確認した後、は種又は植え付けを行って下さい。
(処理後15日以降)



詳しい使用方法はお問い合わせ下さい

新規登録農薬 新発売!!

グレーシア乳剤



幅広い害虫に速く効きます！
新規有効成分が抵抗性害虫にも
高い効果を示します!!

【登録内容】
ミニトマト登録
コナジラミ類・ハモシト
トマトモグリバエ
2,000倍/収穫前日
2回まで 1日

オススメ葉面散布

アミノ☆サンバ
1000倍



- ▶ ストレスに対する抵抗力の増強
(日照不足、低温、高温、環境ストレス)
- ▶ サイズや色つやの向上
- ▶ 根張り向上
- ▶ 病害に対する抵抗性向上

酵素の力で
植物元気！