



スイカ編



病害虫注意報
2019年6月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

うどんこ病、ハダニ類の発生に注意!
発生が増える時期です。多発する前にしっかりと防除しましょう!

今月のおすすすめローテーション



予・治

うどんこ病 **プロパティフロアブル** 3000~4000倍 前日/3回 (ミツバチ0日)

ハダニ類 **スターマイトフロアブル** 2000倍 前日/1回 (ミツバチ1日)

予

うどんこ病
つる枯病
ハダニ類
アザミヤダニ類

ハダニ類 **ホリホシAL水溶剤** 1000~2000倍 3日前/5回
(ハダニ類、アザミヤダニ類は2000倍) (ミツバチ3日)

うどんこ病・つる枯病
菌核病・炭疽病

ベルコート水和剤 1000倍 前日/4回(ミツバチ0日)

ハダニ類・アザミヤダニ類
コナジラミ類・アブラムシ類

モベントフロアブル 2000倍 前日/3回(ミツバチ1日)

うどんこ病
炭疽病・つる枯病

スコア顆粒水和剤 2000倍 前日/3回 (ミツバチ0日)

予・治

アザミヤダニ類・ハダニ類
コナジラミ類

グレーシア乳剤 2000倍 前日/2回 (ミツバチ1日)

NEW

農薬・資材紹介

交配後2週間は農薬散布を避けましょう!

新規登録農薬 新発売!!

グレーシア乳剤

【登録内容】

アザミヤダニ類・ハダニ類・コナジラミ類
2,000倍/収穫前日
2回まで 1日

幅広い害虫に速く効きます!
新規有効成分が抵抗性害虫にも高い効果を示します!!



うどんこ病対策に!!

※モレスタンとの回数に注意

パルミノフロアブル

【登録内容】

うどんこ病
2,000倍/収穫3日前まで
5回以内/ミツバチ5日

高い予防効果を示し、感受性の低下したうどんこ病に
対しても有効です。※高温時注意



オススメ葉面散布

アミノ☆サンバ 1000倍

- ▶ ストレスに対する抵抗力の増強 (日照不足、低温、高温、環境ストレス)
 - ▶ サイズや色つやの向上
 - ▶ 根張り向上
 - ▶ 病害に対する抵抗性向上
- 酵素の力で 植物元気!**



オススメ資材

ファイトカル + ファイトマジック

果実肥大期に7~10日おきに
葉面散布を!

注意! 以下のものとは混用できません!!
ストロビルリン系 (アミスター、ストロビー、シグナムなど)、
無機銅 (カッパーシン、Zボルドーなど)、ホルモン剤、微量
要素入り葉面散布剤、液肥類

