



ナス編



病害虫注意報
2019年7月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期・定植時の防除特集

アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類の発生に注意しましょう！

また、育苗期にすずかび病が少しでも発生すると、本圃で多発する傾向があるので注意しましょう！

【育苗期・定植時のおすすめ粒剤・灌注剤】

	対象病害虫	薬剤名	使用量/倍率	使用時期	使用回数	ハチ影響日数	
						ミツバチ	マルハナ
粒剤	コナジラミ類・アブラムシ類 ミナキイロアザミウマ	ベストガード粒剤	1~2g/株 (コナジラミ類・アブラムシ類は 育苗期1g)	育苗期・ 定植時※	育苗期及び定植時 合わせて1回	45日	30日 以上
	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類・ハダニ類	アルバリン粒剤	1~2g/株 (アブラムシ類は1g/株、 ハダニ類は育苗期2g/株)	育苗期・ 定植時※	育苗期及び定植時 合わせて1回	40日	ミツバチ10日 加22日
灌注	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類・ハダニ類 チャノコリガミ	モベントフロアブル	500倍(25~50ml/株) (アザミウマ類・ハダニ類・ チャノコリガミは50ml/株)	育苗期後半	灌注は1回 散布と合わせて 合計3回	1日	45日
	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類・ハダニ類 ネリムシ類	ベリマークSC	薬量：400株あたり25ml 水量：400株あたり10~ 20L(25~50ml/株)	育苗期後半 ~定植当日	1回	1日	1日

※育苗期：株元処理、定植時：植穴処理土壌混和

【育苗期・散布剤】

薬剤名	希釈倍率	使用時期 /回数	ハチ影響日数		対象病害
			ミツバチ	マルハナ	
ベンレート水和剤	2,000~3,000倍 (褐紋病・菌核病は2,000倍)	前日/3回	1日	0日	褐紋病・菌核病 黒枯病・灰色かび病
ダコニール1000	1000倍	前日/4回	0日	0日	うどんこ病・黒枯病 灰色かび病 すずかび病

新規登録農薬 新発売!!

グレーシア乳剤



幅広い害虫に速く効きます！
抵抗性害虫にも高い効果を示します!!

【登録内容】

コナジラミ類・アザミウマ類
ハダニ類・チャノコリガミ2,000倍
/収穫前日
2回まで ハチ1日
スズカビ-影響日数100日以上

灌注処理にプラス1

ファイトオーツ- 1000倍

同時灌注で効果アップ☆

- ▶暑さによる根痛み防止
- ▶毛細根の充実
- ▶徒長防止



肥料登録
生第83241号