



ナス編



病害虫注意報 2019年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

アザミウマ・ハスモンヨトウの発生に注意しましょう！

発見が遅く老令幼虫になると薬剤が効きづらくなるので、初期発生時の防除に努めましょう！



アザミウマ

- ・春～初夏、晩夏～秋口に多発。
- ・慣れると肉眼で観察可能。
- ・細かい目合いのネットでも通過してハウス内に侵入
→しかし、赤色は壁に見えるので赤色ネットが有効!!



ハスモンヨトウ

- ・成虫は卵塊（数百個）で産卵する
- ・食欲旺盛で酷い食害を起こす
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数	
						ミツバチ	マルハ
①	コナジラミ類・アザミウマ類 ハダニ類・ハモグリバエ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ チャノホリダニ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	
	アブラムシ類・アザミウマ類 コナジラミ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍 (コナジラミ類2,000~3,000倍 アブラムシ類3,000倍)	前日	2回	14日	14日以上
②	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病・黒枯病	ダコニール1000	1,000倍	前日	4回	0日	
	ハダニ類・チャノホリダニ ミナキイロアザミウマ・オオタバコガ ミナキイロアザミウマ・ヨトウムシ テントウムシダマシ類・ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2,000倍	前日	4回	10日	9日
③	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病	ベルコート水和剤	3,000倍	前日	3回	0日	
	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類・コナジラミ類 チャノホリダニ	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	45日以上

開花・結実が早まり、着果数の増加にオススメ!!

液状複合肥料

ツートップ48

0-29-19

1,000~2,000倍 葉面散布

- ・作物が吸収しやすい亜リン酸カリと水溶性カリを配合！
- ・一番花が揃い品質向上、花芽の充実に！
- ・軟弱徒長予防をし、健康で強い苗を！

※石灰硫黄合剤などのアルカリ性農薬や、ホルモン剤・カルシウム入りの肥料との混用不可。銅剤との混用及び近接散布は避ける。

肥料登録：輸第13355



高温対策に！ 効果の持続は約1か月

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上
ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10~20錠



オススメ葉面散布

アミノ☆サンバ

1000倍

- ▶ ストレスに対する抵抗力の増強
(日照不足、低温、高温、環境ストレス)
- ▶ サイズや色つやの向上
- ▶ 根張り向上
- ▶ 病害に対する抵抗性向上

酵素の力で
植物元気！

