



レタス編

病害虫注意報 2019年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**チョウ目害虫
注意!**

ハスモンヨトウ・オオタバコガ

老齢幼虫は薬剤が効きにくく、防除が難しくなります。
定期防除と幼虫を見かけたら早めの防除を心がけましょう!

ハスモンヨトウ幼虫



病害注意!

すそ枯病・斑点細菌病

曇天が続いたり、突然の大雨などが多くなります。
病気の発生前にしっかり防除することを心がけましょう!

アブラムシ注意!

アブラムシ

秋口に発生することがあります。新芽などをよく観察しましょう!
特に育苗期にアブラムシ剤を使用していない場合は発生に注意!



今月のおすすめローテーション ※カッコ内は非結球レタス登録内容



時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
10月①	軟腐病・腐敗病 斑点細菌病	予 キノドーフロアブル	800~1,000倍	21日前まで (30日前まで)	5回
	ウバ類・オタバコガ ヨウムシ・ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日まで	2回
アブラムシの発生が懸念される場合		モベントフロアブル	2,000~4,000倍	7日前まで (14日前まで)	3回
10月②	菌核病・すそ枯病 灰色かび病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日まで	3回
	オタバコガ・ハスモンヨトウ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回
アブラムシの発生がある場合		トランスフォームフロアブル	2,000倍	前日まで	3回
10月③	すそ枯病・軟腐病 腐敗病	予・治 バリダシン液剤5	800倍	7日前まで	3回
	ナモグリバエ	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	3日前まで	2回
アブラムシの発生がある場合		モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍 (4,000倍)	前日まで (7日前まで)	3回 (1回)

弱った株の回復に!

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録: 生第91402号

軟弱徒長予防に!

液状複合肥料

ツートップ48

0-29-19

1,000~2,000倍 葉面散布

※石灰硫黄合剤などのアルカリ性農薬や、ホルモン剤・カルシウム肥料との混用不可。銅剤との混用及び近接散布は避ける。

肥料登録: 輪第13355