



ブロッコリー編

病害虫注意報 2019年11月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

花薺腐敗病・黒すす病 対策



花薺腐敗病

症状

- ▶ 花薺が淡褐色～黒褐色に腐敗する

多発条件

- ▶ 激しい降雨
- ▶ 食害などが多い圃場



黒すす病

症状

- ▶ 葉や花薺に発生
- ▶ 小黒点の症状が広がる

多発条件

- ▶ 多湿条件
- ▶ 前作発生した圃場での栽培

今月のおすすめローテーション

*カッパーシン・クロシールドは花薺形成期以降は散布不可（薬害）

時期	対象病害	薬剤名	倍率	使用時期	回数
11月 ①	黒斑細菌病・べと病 軟腐病・斑点細菌病	予 クプロシールド	1,000～2,000倍 (軟腐病1,000～1,500倍)	—	—
11月 ②	菌核病・黒すす病 べと病	予・治 シグナムWDG* ¹	1,500倍 (べと病1,000～1,500倍)	7日前	2回
11月 ③	軟腐病・黒斑細菌病	予 スターナ水和剤	2,000倍	14日前	2回
11月 ④	黒すす病・菌核病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回

*1 シグナムWDGはカントスドライフロアブルと合わせて2回以内

*2 ズボルドー・クロシールド・カッパーシン水和剤は花薺形成期以降は散布不可（薬害）

その他おすすめ薬剤

対象病害	薬剤名	倍率	使用時期	回数
花薺腐敗病など	予 ズボルドー* ²	500倍	-	-
黒腐病	予・治 カッパーシン水和剤	1,000倍	21日前	4回
花薺腐敗病	予・治 マイコシールド	1,000～2,000倍	14日前	2回
黒斑細菌病・軟腐病 花薺腐敗病	予 マスタピース水和剤	1,000～2,000倍	前日	-
べと病・黒すす病	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	3日前	3回

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！

カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キソタン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した
植物活力資材



肥料登録：
生第91402号

軟弱徒長予防に！

ツートップ⁴⁸

0-29-19

1,000～2,000倍 葉面散布

※石灰硫黄合剤などのアルカリ性農薬や、ホルモン剤・カルシウム入りの肥料との混用不可。銅剤との混用及び近接散布は避ける。



肥料登録：
輸第13355