



イチゴ編

病害虫注意報 2019年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

年内の病害虫発生を抑えるために引き続き定期防除を行いましょう！

スパスパトリオ

スパイカルEX×1 & スパイデックス×3

天敵混用
放飼器付き!!



＜天敵混用放飼器のメリット＞

- ・放飼間隔の距離が短くなるため効果が安定！
- ・より均一に天敵が放飼できます！
- ・従来の約6割の時間で放飼が可能！



☆ 11月中旬までには天敵を導入し、導入後1～2週間は、薬剤散布や葉かきは控えましょう！

定植後 おすすめローテーション

薬剤散布前には葉かきを行い、
薬剤のかかりを良くしましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
11月①	灰色かび病・輪斑病 うどんこ病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日			0日
	ハダニ類・シクラメンホリガイ	コロマイト水和剤 卵(ハダニ類)効果あり	2,000倍	前日	2回	1日			7日
	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	1日	-		1日
11月②	うどんこ病・灰色かび病	予・治 オルフィンフロアブル	2,000～3,000倍	前日	1回	1日			0日
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日			0日
	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	1日	-		1日
11月③	炭疽病・灰色かび病	予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍 (炭疽病2,000倍)	前日	3回	1日			0日
	ハダニ類・シクラメンホリガイ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	2,000倍	前日	2回	1日			0日
	ハダニ類 (ハダニの発生が多い時)	ニツラン水和剤 卵(ハダニ類)効果あり	2,000～3,000倍	前日	2回	1日			0日

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

光合成能力UP! キレートマグネシウム + 各種微量元素

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
★日照不良時の代謝の向上!

肥料登録 生第87201号

軟弱徒長予防に!

ツートップ[®]48

0-29-19

1,000～2,000倍 葉面散布

※石灰硫黄合剤などのアルカリ性農薬や、ホルモン剤・カルシウム入りの肥料との混用不可。銅剤との混用及び近接散布は避ける。

肥料登録 輸第13355