



キャベツ編

病害虫注意報 2019年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

べと病・菌核病 対策

べと病



症状

- ▶ 黒褐色の病斑
- ▶ 汚白色のかび

多発条件

- ▶ 10~15℃
- ▶ 連続する降雨

菌核病



症状

- ▶ 灰褐色の病斑・腐敗
- ▶ ネズミ糞状の菌核

多発条件

- ▶ 圃場の排水不良
- ▶ 軟弱徒長

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
11月 ①	べと病	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
11月 ②	菌核病・株腐病	予 ロブラール水和剤	1,000倍	7日前	4回
11月 ③	菌核病・べと病・株腐病	予・治 シグナムWDG	1,500倍 (べと病 1,500~2,000倍)	7日前	2回
11月 ④	菌核病	予・治 スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回

その他おすすめ薬剤

対象病害虫	薬剤名	倍率	時期	回数	
べと病	予 ランマンフロアブル	2,000倍	3日前	4回	
べと病	予 レーバスフロアブル	2,000倍	7日前	3回	
べと病・①ピシウム腐敗病	予・治 フォリオゴールド	800~1,000倍 (①1000倍)	14日前	2回	
菌核病	株腐病 根朽病	予 アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回
	株腐病	予 ネクスターフロアブル	1,000倍	7日前	3回
	①黒斑病 ①根朽病 ②灰色かび病	予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍 (①2000倍、②3000倍)	3日前	3回

弱った株の回復に!

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録: 生第91402号



軟弱徒長株を強く!

エレマックス赤

0-28-26
1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止!
▶ 病害抵抗力の向上に!

※石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録: 輸第9423号

