



レタス編

病害虫注意報 2019年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

すそ枯病・斑点細菌病 対策

すそ枯病

原因菌：リゾクトニア菌

発生条件：やや低温で雨が多く、土壌湿度が高い

注意点・予防のポイント：

- ▶ 中耕時の土のかかりが多いと多発しやすい
- ▶ 土壌からの伝染が多いため、マルチなどで土の跳ね上がりを防ぐ
- ▶ 結球期に散布すると被害は減少する

斑点細菌病

原因菌：バクテリア(細菌)

発生条件：土壌から伝染する

継続的な多湿状態で多発する

注意点・予防のポイント：

- ▶ 風や雨、作業などで植物体上に運ばれると発病する
- ▶ 全面マルチ栽培などの土の跳ね上げ防止を行う
- ▶ トンネル栽培では換気に注意し、結露を減らす
- ▶ 被害株を廃棄し、多発圃場では連作を避ける

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	非結球レタス登録
11月①	すそ枯病・菌核病 灰色かび病	予 ロブラール水和剤	1,000倍 (灰色かび病 1,000~1,500倍)	14日前	3回	×
	オタバコガ・ヨウムシ ハスモンヨトウ	トルネードエースDF	2,000倍	7日前	2回	○
11月②	すそ枯病・灰色かび病 菌核病・ベと病	予・治 シグナムWDG	1,500倍 (ベと病 1,500~2,000倍)	7日前	2回	○ (14日前)
	ハゲリバエ類・ハスモンヨトウ オタバコガ・ヨウムシ	プレバソフロアブル5	2,000倍 (ハゲリバエ類 1,000~2,000倍)	前日	3回	○
11月③	ベと病	予 レーバスフロアブル	2,000倍	7日前	3回	○
	アザミウマ類・ハゲリバエ類 オタバコガ・ハスモンヨトウ	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回	○
11月④	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	前日	3回	○
	アザミウマ類・ハゲリバエ類 オタバコガ・ヨウムシ ハスモンヨトウ	グレース乳剤	2,000~3,000倍	3日前	2回	○

弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録
生第91402号

軟弱徒長予防に!

液状複合肥料

ツートップ48

0-29-19

1,000~2,000倍
葉面散布

※石灰硫黄合剤などのアルカリ性農薬や、ホルモン剤・カルシウム入りの肥料との混用不可。銅剤との混用及び近接散布は避ける。



肥料登録
輸第13355

ベネビアOD

非結球レタス

登録追加になりました!

レタス・非結球レタス
オタバコガ・ハスモンヨトウ・ヨウムシ
⇒2,000~4,000倍
ハゲリバエ類・アブラムシ類
⇒2,000倍
前日まで/3回以内

