



キク編



病害虫注意報 2019年12月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

引き続き、白さび病と害虫の発生に注意しましょう！

閉めきったハウス内は湿度が高くなり、白さび病発生の原因となります。
また、ハダニ類、アザミウマ類、アブラムシ類等、各種害虫の発生にも注意が必要です！

<白さび病対策>

原因：・夜間の高湿度
特に、暖かい雨の日には注意が必要！
湿度95%以上の環境が続くと
白さび病発生の危険性が高まります。

対策：・暖房機、循環扇などを使用し
除湿を行いましょ。う。
モヤコンを活用しましょ。う！
・定期散布を確実に行いましょ。う！！

今月のおすすめローテーション



地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
生育初期	アザミウマ類・材外ハダニ	プリンスフロアブル	2,000倍	発生初期	5回
	白さび病	予 ジマンダイセンフロアブル	500~800倍	-	8回
消灯時	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類	inochio セイレーンフロアブル	2,000倍	発生初期	3回
	白さび病・灰色かび病	予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	発病初期	5回
発蕾時	アザミウマ類・ハダニ類 材外ハダニ・ハダニ幼虫	グレーシア乳剤	2,000倍	発生初期	2回
	白さび病	予・治 inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍	発病初期	3回
破蕾時	ハダニ類	スターマイトフロアブル	2,000倍	発生初期	1回
	うどんこ病※・黒斑病※・ 灰色かび病※・白さび病・ アザミウマ類※・ハダニ類※	予・治 ポリオキシシAL水溶剤	2,500倍	発病初期	8回

※…花き類・観葉植物登録

土壌病害虫対策

ネマトリンエース粒剤

5kg/10kg

散布、土壌混和後
すぐに播種、定植が可能！

対象病害虫

・ネグサレセンチュウ 20~25kg/10a
・ナミハダニ 20kg/10a



ディ・トラパックス油剤

20L

センチュウ類、土壌病原菌など
広範囲にわたる防除に！

対象病害虫

・萎凋病 ・半身萎凋病 ・一年生雑草
・センチュウ類(ハダニを除く)



30~40L/10a