



キュウリ編

病害虫注意報 2019年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害特集

いずれの病気も多発すると防除が困難なので、予防散布を心がけましょう！




うどんこ病

症状：
葉にうどん粉をふりかけたように白い粉状のカビを生ずる。

発病適温：25℃前後

注意点：
やや乾燥気味で、光線不足の時に発生が多い。



褐斑病

症状：
初め淡褐色、円形の小白点を形成し、次第に拡大して中央灰褐色の不整形斑点になる。

発病適温：28℃前後

注意点：
高温期に施設内を多湿にするとう急激に増加する。発病後の防除は困難なので、予防散布を心がける。




べと病

症状：葉脈に囲まれた角形で、初め水浸状、黄色の病斑を形成し、古くなると褐変する。

発病適温：20～24℃

注意点：曇雨天が続いたりして施設内が多湿気味だと多発する。肥料切れや樹勢が弱った時に多発しやすい。



つる枯病

症状：
茎の被害が最も多い。病斑上に黒色小粒点を生ずるのが特徴。

発病適温：20～24℃

注意点：
施設内が多湿で、樹勢が弱った時に多発しやすい。薬剤がかかりにくい茎や地際部に発病しやすいので、丁寧な散布を心がける。

各病害別 おすすめ薬剤

対象病害	薬剤名	倍率	使用時期	回数
うどんこ病	予・治 パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回
	プロパティフロアブル	3,000～4,000倍	前日	3回
褐斑病	予 セイビアーフロアブル20	1,000倍	前日	3回
	ベルコートフロアブル	2,000倍	前日	7回
べと病	予・治 ジャストフィットフロアブル	5,000倍	前日	合わせて3回
	ベトファイター顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日	
	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
つる枯病	予・治 トップジンMペースト	原液塗布	発病初期	5回
	スミレックス水和剤	1,000倍	前日	6回

厳寒期対策おすすめ資材

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化!

ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶光合成の促進

▶毛細根の充実

▶抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム

+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください



おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

NEW-SB酸素

初期の活着時や高温期に

灌水処理がお勧め!

5~10kg/10a

7~10日おき灌水処理

