



# ミニトマト編

病害虫注意報 2019年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 愛知県で「コナジラミ」類の注意報が発令されました!!

### コナジラミ類対策特集 10/31付け

- ▶ 開口部に防虫ネット(目合い0.4mm以下)を展張する。
- ▶ 薬剤抵抗性を防ぐため、IRACコードが同じ薬剤の連続散布は避ける。
- ▶ コナジラミ類はウイルス病(黄化葉巻病・黄化病)を媒介するので少発生でも防除を行う。発生株は伝染源となるので、見つけ次第ハウス外へ持ち出し処分する。

気門封鎖剤を利用して  
他剤の使用回数を抑えましょう!

## フォーモン

展着剤登録あります!



野菜類登録  
アブラムシ類・ハダニ類  
コナジラミ類・うどんこ病  
1,000倍/収穫前日  
回数制限なし 1日

※高温注意・混用不可薬剤あり

### コナジラミ類に有効な薬剤

- ・アルバリン顆粒水溶剤
  - ・コロマイト乳剤
  - ・クリアザールフロアブル
  - ・モスピラン顆粒水溶剤
  - ・ディアナSC
  - ・アニキ乳剤
  - ・フォーモン など
- ハチの影響日数  
要確認



## 今月のおすすめローテーション

※総使用回数に注意

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
12月①	疫病・葉かび病	ホライズンドライフロアブル	1,500~2,500倍 (葉かび病2,500倍)	前日	3回※	0日
	コナジラミが多い場合	フォーモン	1,000倍	前日	-	0日
12月②	疫病	ランマンフロアブル	1,000~2,000倍	前日	4回	0日
	コナジラミが多い場合	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3回	1~3日
12月③	疫病	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回	0日
	コナジラミが多い場合	クリアザールフロアブル	2,000~4,000倍 (トマトハダニ2,000倍)	前日	2回	1日

## 厳寒期対策おすすめ資材

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化!

### ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶ 転流量増加(糖度アップ)

▶ 毛細根の充実

▶ 抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム

+ 各種微量元素

★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★ 日照不良時の代謝の向上!

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください



## おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

## NEW-SB酸素

初期の活着時や高温期に

灌水処理がお勧め!

5~10kg/10a

7~10日おき灌水処理

