



# ミニトマト編

病害虫注意報 2020年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 疫病・灰色かび病特集

### 疫病

#### 発病条件：

低温で、多湿条件下で発生が多くなる。

#### 症状・注意点：

初め灰緑色水浸状で、次第に暗褐色大型病斑になる。多湿時には、表面に白色のかびを生ずる。感染～発病が短く、**短期間で大発生してしまう。**



### 灰色かび病

#### 発病条件：

気温20℃位のやや低温で、多湿条件下で発生が多くなる。

#### 症状・注意点：

ゴーストスポットと呼ばれる白色円形の小斑点が果実に生ずる被害も、この病原菌の影響です。



**⚠ 疫病の発生初期は灰色かび病と間違えやすい！**

薬剤が全く違うので、病気の判断と剤の選択は慎重に！



## 今月のおすすめローテーション

コナジラミは発生の少ないうちに確実に防除しましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
1月 ①	葉かび病・灰色かび病・菌核病 すすかび病・うどんこ病・斑点病	<b>予</b> アフェットフロアブル	2,000倍 (うどんこ病2,000～ 4,000倍)	前日	3回	1日
	うどんこ病・コナジラミ類 アブラムシ類・ハダニ類	フーモン	1,000倍	前日	-	1日
1月 ②	疫病	<b>予・治</b> ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日
1月 ③	葉かび病・灰色かび病・菌核病 すすかび病・うどんこ病	<b>予・治</b> シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類 ミコトイロアザミマ	ウララDF	2,000倍 (アブラムシ類2,000～ 4,000倍)	前日	3回	0日

カリ欠乏対策に！

### エレマックス 赤・黄

500～1,000倍で  
10～14日おきに葉面散布

★草勢が弱い時は、窒素入りのエレマックス黄がおすすめです！  
★カルシウム剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥との混用は避けてください。



光合成能力UP!

### ファイトオーツ

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶転流量増加（糖度アップ）

▶毛細根の充実

▶抵抗性誘導物質の向上



◆◆新年のご挨拶◆◆  
あけまして

おめでとうございます

本年も皆様の作物の健康をお守りするため、病害虫や農業に関する情報をお届け致します。本年もどうぞよろしくお願い致します。

