



イチゴ編

病害虫注意報 2020年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

作終盤の病害虫の蔓延を防ぐために 引き続き定期的な防除をしましょう！

今月の防除ポイント

展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

※高温注意
※混用不可薬剤あり



アザミウマ対策に！

アザミウマは1度発生してしまうと
防除が難しいです！

→ サイドや天窓を開ける前に
ハウス周りの除草を!!



圃場内への飛び込みを防ぐことが大切です！

薬剤散布前には葉かきを行い、
薬剤のかかりを良くしましょう！

収穫中 おすすめローテーション③

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハ	ミカ	刊
1~2月頃	ハダニ類	【天敵】スパイデックス(チリカブリダニ)	100~300ml/10a (約2,000~6,000頭)						
		・天敵導入後10~14日間は、葉かき 及び 薬剤散布は控え天敵の定着を促しましょう							
	・ダニが多い圃場は、2週続けて天敵を導入しましょう								
2月①	うどんこ病 灰色かび病 予	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	1日			0日
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日			0日
2月②	うどんこ病 灰色かび病 予・治	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	1日	0日		0日
	ハダニ類 アザミウマ類	カスケード乳剤	4,000倍	前日	3回	1~2日	2日	7日	-

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

NEW-SB酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に！
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします！

5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理



増える日差しに
負けない根張りに!!

チップバーン&軟化玉 対策に!

ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号