



キュウリ編

天敵未導入版



病害虫注意報 2020年2月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**ミナキイロアザミウマ等の発生が多くなりやすい時期です。
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。**

◎11月下旬以降アザミウマ類の発生が多くなりやすい時期になっていきます。新芽や粘着板（青色）を観察して、発生状況を確認するようにして下さい。また、ハウス周りの除草や防虫ネットを設置して、アザミウマ類の発生を予防して下さい。



黄化えそ病



アザミウマ類成虫

今月のおすすめローテーション

天敵導入されない方向けです！
導入される方は別紙をご確認ください。

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 スルスルー
2月①	べと病	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回	0日
	アブラムシ類・ハダニ類 アザミウマ類・コナジラミ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	30日
2月②	灰色かび病・菌核病 うどんこ病・褐斑病 つる枯病	予 ケンジャフロアブル	1,500倍 (菌核病・灰色かび病 1,000~1,500倍)	前日	4回	0日
	アブラムシ類・アザミウマ類 コナジラミ類・ウリノメイガ ウリハムシ	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍 (ウリハムシ4,000倍 コナジラミ類・ウリノメイガ 2,000倍)	前日	3回	7日
2月③	べと病	予・治 ジヤストフィットフロアブル	5,000倍	前日	3回	0日
	ミナキイロアザミウマ・ハダニ類 ウリハムシ・ウリノメイガ ミナキイロアザミウマ	コテツフロアブル	2,000倍	前日	3回	14日
2月④	うどんこ病・灰色かび病	予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日
	アザミウマ類・コナジラミ類 ハダニ類・ウリノメイガ ハモンヨトウ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	7日

光合成能力UP!
ファイトオーツ
1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆
▶ 転流量増加
▶ 毛細根の充実
▶ 抵抗性誘導物質の向上

肥料登録
生第83241号

ケンジャフロアブル
つる枯病
追加登録されました！

灰色かび病・菌核病
1,000~1,500倍
うどんこ病・褐斑病・つる枯病
1,500倍
前日/4回以内

おすすめ資材
増える日差しに負けない根張りに!!
NEW-SB酸素

☆ 土壌に酸素を供給し、
根の活動を活発に!
☆ 肥料・葉面散布剤の
吸収を良くします!
5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理