



キュウリ編

天敵導入版



病害虫注意報 2020年2月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

今月の防除ポイント

天敵 スワルスキー



【野菜類での使用量】250~500ml
(25,000~50,000頭)/10a
キュウリに対しては定着性に優れ、安定した防除効果を発揮します。成虫は捕食できないため、害虫密度を低く抑えてから放飼することが成功のポイントです。
天敵導入前後の薬剤散布は、天敵に影響の少ない薬剤を確認して使用してください。

スワルスキープラスUMもお薦め



【使用方法】
100~200パック/10a
(25,000~50,000頭/10a)
包材のリニューアルによってパック内の天敵の増殖力が向上しました。パック製剤は作物全体への分散に時間を要するため、早めの放飼をお勧めします。

今月のおすすめローテーション

天敵導入される方向けです！
未導入の方は別紙をご確認ください。

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 スワルスキー
2月①	べと病 予・治	ジヤストフィットフロアブル	5,000倍	前日	3回	-
	アザミウマ類・コナジラミ類 ハモグリバエ類	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	14日以上
2月②	灰色かび病・菌核病 うどんこ病・褐斑病 つる枯病 予	ケンジャフロアブル	1,500倍 (菌核病・灰色かび病 1,000~1,500倍)	前日	4回	0日
	アザミウマ類・コナジラミ類 ハモグリバエ類・ウリノメイガ ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	7日
2月③	うどんこ病・灰色かび病 予・治	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日
	アザミウマ類・コナジラミ類 カメシラミ類・アブラムシ類 ウリムシ	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍 (コナジラミ類・アブラムシ類 2,000~3,000倍)	前日	2回	0日
2月④	アザミウマ類・コナジラミ類 チャノコリガミ	スワルスキー	250~500ml/10a (約25,000~ 50,000頭)	発生直前~ 発生初期	-	-

光合成能力UP!
ファイトオーツ
1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆
▶ 転流量増加
▶ 毛細根の充実
▶ 抵抗性誘導物質の向上

肥料登録
生第83241号

ケンジャフロアブル
つる枯病
追加登録されました!

灰色かび病・菌核病
1,000~1,500倍
うどんこ病・褐斑病・つる枯病
1,500倍
前日/4回以内

おすすめ資材
増える日差しに負けない根張りに!!
NEW-SB酸素

☆ 土壤に酸素を供給し、
根の活動を活発に!
☆ 肥料・葉面散布剤の
吸収を良くします!
5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理