



# ナス編

## 病害虫注意報 2020年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



**ミナミキイロアザミウマ等の発生が多い傾向です。  
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。**



◎11月下旬以降アザミウマ類の発生が多くなりやすい時期になっていきます。新芽や粘着板（青色）を観察して、発生状況を確認するようにして下さい。また、ハウス周りの除草や防虫ネットを設置して、アザミウマ類の発生を予防して下さい。



アザミウマ吸汁痕



アザミウマ類成虫

## 今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数		
						ミツバチ	マルハナ	スルスキー
2月①	うどんこ病・灰色かび病 ハモンヨトウ・アザミウマ類 オタバコガ・ハモグリバエ類	予・治 <b>ショウチノスケフロアブル</b> <b>プレオフロアブル</b>	2,000倍 1,000倍	前日	2回 4回	1日 1日	0日	0日
	灰色かび病・すすかび病 菌核病・うどんこ病	予 <b>アフェットフロアブル</b>	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日
2月②	オタバコガミミ類 アザミウマ類	<b>ファインセーブフロアブル</b>	1,000～ 2,000倍 (オタバコガミミ類 1,000倍)	前日	3回	1日		0日
2月③	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病・ハダニ類 アザミウマ類	予・治 <b>ポリオキシシAL水溶剤</b>	5,000倍	前日	3回	3日	0日	21日
	アザミウマ類・ハダニ類 ハモグリバエ類・コナジラミ類 チャノコリダニ ハモンヨトウ・オタバコガ	<b>アフアーム乳剤</b>	2,000倍	前日	2回	2日		7日
2月④	すすかび病・うどんこ病 菌核病・灰色かび病	予・治 <b>シグナムWDG</b>	1,500倍 (すすかび病 1,500～2,000倍)	前日	3回	0日		0日
	アザミウマ類・コナジラミ類 ハモグリバエ類・オタバコガ ハモンヨトウ	<b>ディアナSC</b>	2,500～ 5,000倍 (コナジラミ類 2,500倍)	前日	2回	3日	1～3日	14日以上

### おすすめ資材

増える日差しに負けない根張りに!!

## NEW-SB酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に!
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします!

5～10kg/10a

7～10日おき灌水処理



### 厳寒期対策おすすめ資材

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化!

## ファイトオーツ&ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

キレートマグネシウム

▶ 転流量増加

+各種微量要素

▶ 毛細根の充実

★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

▶ 抵抗性誘導物質の向上

★ 日照不良時の代謝の向上!



アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください



肥料登録  
生第83241号

肥料登録  
生第87201号