




スイートコーン編

病害虫注意報 2020年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

アブラムシの発生に注意!



1頭が1ヶ月で1万頭に!!

アブラムシは単為生殖（クローン）なので、1頭でも多量に増殖してしまいます。収穫前のアブラムシ防除がとても重要です!

気温が上がると(12℃前後)密度が高くなると...

交尾しなくても幼虫を増やせる...(クローン)

! 今月もチョウ目害虫の発生に注意しましょう!

▼とうもろこしを食害するチョウ目害虫の特徴

害虫名	主な食害部	発生回数/年	体長(老齢幼虫)
アワノメイガ	茎・雄穂・雌穂・子実	3回程度	約25 mm
アワヨトウ	葉(中肋を残す)・子実	3~4回程度	約35 mm
オオタバコガ	雄穂・雌穂・絹糸・子実	2~3回程度	約40 mm

▼ 収穫の1週間前に使用できるアブラムシ・チョウ目害虫防除剤

アブラムシ類登録	チョウ目害虫	薬剤名	倍率	時期	回数	ヤングコーンでの使用
○	-	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	前日	3回	○2,000倍 前日/2回
○	-	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍	3日前	3回	×
○	-	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	×
×	オオタバコガ	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000倍	発生初期 (但し収穫前日まで)	-	○ (野菜類登録 1,000~2,000倍))
×	アワノメイガ	兼商ヨーバルフロアブル	5,000倍	前日	3回	×
×	アワノメイガ・オオタバコガ	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	2回	○
×	オオタバコガ	アニキ乳剤	1,000倍	前日	3回	○
×	アワノメイガ	パダン粒剤4	6kg/10a (株の上から均一に散粒)	7日前	2回	×

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。

登録追加情報

ウララ^{DF}

かわい顔してアブラムシを狙い撃ち!

未成熟とうもろこし適用拡大されました!

- ▶ 吸汁を速効的に阻害し、餓死させるユニークな作用
- ▶ 既存剤とは異なる系統の浸透性殺虫剤

アブラムシ類2000~4000倍
3日前/2回以内

光合成能力UP!

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録
生第87201号