



# メロン編

## 病害虫注意報 2020年6月号

inochio  
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### うどんこ病、ハダニ類の発生にご注意ください！

発生が増える時期になりました！多発する前にしっかりと防除しましょう！

うどんこ病

(写真はキュウリ)




ハダニ類



曇天・降雨が続くとつる枯病の発生も  
多くなりますので、ご注意ください！

幼虫と若虫は  
農薬効果が高い！



◆多湿～乾燥まで広範囲の湿度条件下で蔓延します。

◆肉眼又はルーペで確認できます。

◆葉の表面にうどん粉を振りかけたような白色、

◆葉表に、白いカスリ状の小斑点が発生します。

粉状のカビを生じ、ひどくなると次々と枯れ上がります。◆多発するとクモの巣状の糸を張り、次第に葉が枯れ上がります。

### おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！



時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
6月 ①	うどんこ病・つる枯病	アフェットフロアブル	2,000～4,000倍 (つる枯病2,000倍)	前日	3回	1日
	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日
6月 ②	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	1回	1日
6月 ③	うどんこ病 つる枯病・べと病	フォリオゴールド	800～1,000倍 (うどんこ病・つる枯病800倍)	3日前	3回	－
	ハダニ類	ダブルフェースフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	2,000倍	前日	1回	1日
6月 ④	うどんこ病	プロパティフロアブル	3,000～4,000倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・アザミワ類 ハモグリバエ類・アリメイガ	アファーム乳剤	2,000倍 (アザミワ類1,000～2,000倍)	前日	2回	2日

### 新規登録農薬紹介



兼商 **ヨーバルフロアブル**®

- ★ 幅広い殺虫スペクトル
- ★ IRACコード：28
- ★ ミツバチ：灌注1日、散布14日

アブラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類  
灌注・散布 登録  
詳しい登録内容はお問い合わせください!!



光合成能力UP！

**ファイトマジック**  
1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素  
★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！  
★日照不良時の代謝の向上！



肥料登録  
生第87201号