



# スイカ編

病害虫注意報 2020年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## うどんこ病、ハダニ類の発生にご注意ください！

発生が増える時期になりました！多発する前にしっかりと防除しましょう！


曇天・降雨が続くとつる枯病の発生も多くなりますので、ご注意ください！

### うどんこ病

(写真はキュウリ)



### ハダニ類



- ◆多湿～乾燥まで広範囲の温度条件下で蔓延します。
- ◆葉の表面にうどん粉を振りかけたような白色、粉状のカビを生じ、ひどくなると次々と枯れ上がっていきます。
- ◆肉眼又はルーペで確認できます。
- ◆葉表に、白いカスリ状の小斑点が発生します。
- ◆多発するとクモの巣状の糸を張り、次第に葉が枯れ上がります。

## おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
6月 ①	うどんこ病	<b>プロパティフロアブル</b>	3,000～4,000倍	前日	3回	0日
	ハダニ類	<b>ダニサラバフロアブル</b> 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日
6月 ②	うどんこ病	<b>パンチョTF顆粒水和剤</b>	2,000倍	前日	2回	0日
	ハダニ類・アザミワタ類	<b>アグリメック</b>	500～1,000倍	前日	3回	<b>14日</b>
6月 ③	うどんこ病 つる枯病・菌核病	<b>アフエットフロアブル</b>	2,000倍	前日	3回	1日
	アザミワタ類・ハダニ類 コナジラミ類・ウリメイト オオハコガ・ハスモンヨトウ	<b>グレーシア乳剤</b>	2,000倍	前日	2回	1日
6月 ④	うどんこ病・つる枯病 ハダニ類・アザミワタ類	<b>ポリオキシシAL水溶剤</b>	1,000～2,000倍 (ハダニ類・アザミワタ類2,000倍)	3日前	5回	3日
	ハダニ類	<b>マイトコーネフロアブル</b> 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	1回	1日

### 登録追加情報

## ダニコングフロアブル

新規有効成分がハダニをパワフルに撃退!!

**スイカ登録されました！**

ハダニ類 3,000倍  
前日まで/1回/ミツバチ1日

※ダブルフェースフロアブルとの回数注意

### 新規登録農薬紹介

## 兼商 ヨーバルフロアブル

- ☆ 幅広い殺虫スペクトル
- ☆ IRACコード：28
- ☆ **ミツバチ：灌注1日、散布14日**

アブラムシ類・コナジラミ類・ハスモンヨトウ  
灌注・散布 登録

詳しい登録内容はお問い合わせください!!