



ゲリラ豪雨・長雨対策編

病害虫注意報 2020年7月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



ゲリラ豪雨・長雨後は早めの樹勢回復を!!



浸水による土壌の酸欠や
長雨による樹勢低下に!



100~200倍
または
5~10kg/10a
10日おきに2回灌注

NEW-SB 酸素

雨風に晒された後のケアにおすすめ!

強い風雨の後は傷口から病害に感染しやすくなります

軟弱徒長株を強く!

弱った株の回復に!



エレマックス赤 + カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

「亜りん酸」配合 N-P-K=0-28-26

茶葉から抽出した植物活力資材



◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください。

◎ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避けてください。

台風・豪雨後の急激な日射によるしおれや草勢低下対策に!

施設栽培では遮光と組み合わせての利用も有効です!!

光合成能力UP!

萎れ・葉焼け予防



ファイトオーツ + ファイトカル

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

酵母由来のアミノ酸
キトサンオリゴ糖

キレートカルシウム剤
トレハロース・グリシンベタイン配合
優れた浸透性

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類との混用は出来ません



各作物に適用のある殺菌剤との混用散布が有効です

※必ずラベルの登録内容をご確認ください

台風・豪雨直後とその1週間後の2回散布がおすすめです!