



ミニトマト編

病害虫注意報 2020年8月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

病害虫にご注意ください!!!

⚠ ウイルス病は、発病してしまうと治療する術がありません! ⚠



トマト黄化葉巻病(TYLCV)

タバコジラミ(バイタイプ B、Q) がウイルスを媒介する病気です。初め新葉の緑が退色しながら葉巻し、葉脈間が黄化し縮れる。進行すると葉はちりめん状、節間が短くなり株は萎縮する。



トマト黄化えそ病(TSWV)

アザミウマ類がウイルスを媒介し、感染した株は治りません。主な症状は茎・葉・果実への黒色のえそ症状を生じます。葉は下向きに湾曲する。軽い症状ではモザイク・黄化症状を生じます。



トマト黄化病(ToCV)

コナジラミ類(オンジツ・タバコ)がウイルスを媒介します。症状は葉脈間の黄化、進行するとえそ症状が発生します。中下位葉に出やすく、マグネシウム欠乏症と似た症状です。

感染が疑わしい株は速やかに除去しましょう! 気になる症状は診断室でお調べします!

発生初期から化学的・物理的防除をしっかり行っていきましょう!
耐病性・抵抗性品種であっても定期的な防除を行うことをお勧めします!

今月のおすすめ薬剤

コナジラミ類・アザミウマ類防除
ハスモンヨトウ・オオタバコガの発生にも注意しましょう!

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数	
					ミツバチ	マルハナ
コナジラミ類・アブラムシ類 トマトヒゲナシ	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類は2000倍)	前日	2回	10日	2~5日
コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類 加バネ科ノコバエ類	ベストガード水溶剤	1,000~2,000倍	前日	3回	10日以上	
コナジラミ類・アザミウマ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	28日	7日
ハスモンヨトウ・オオタバコガ ハメグリバエ類	プレオフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日	
コナジラミ類・トマトヒゲナシ ハメグリバエ類・オオタバコガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日	

軟弱徒長株を強く!
0-28-26
エレマックス赤
1,000倍 葉面散布
▶ 樹を締めて徒長防止!
▶ 花芽分化・着果(花)の向上に!
▶ 病気抵抗力の向上に!
◎ 石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※ カテキンパワーとの混用は可能です
肥料登録 輸第9423号

高温対策に!
すずみどり
香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防!
更に光合成を向上
効果の持続は約1か月
ハウス内に吊るすだけ
10a当たり1~2袋

おすすめ資材
日差しに負けない根張りのために!!
NEW-SB酸素
☆ 土壤に酸素を供給し、根の活動を活発に!
☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします!
5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理