



ブロッコリー編



病害虫注意報 2020年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ対策

ハスモンヨトウ



- ・成虫は卵塊（数百個）で産卵する
- ・食欲旺盛で酷い食害を起こす
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある

シロイチモジヨトウ



- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み、新葉に入る場合もある
- ・7月以降、フェロモントラップの誘殺量が多い！

2020年7月の愛知県の調査で、田原では平年の**5倍以上**の発生が観察されています。



チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

時期	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
9月①	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回
9月②	トルネードエースDF	2,000倍	14日前まで	2回
9月③	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日まで	2回
9月④	グレースシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前まで	2回

その他オススメ薬剤

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	3日前まで	3回
アフーム乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回
ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍(散布)	前日まで	3回
コテツフロアブル	2,000倍	3日前まで	2回
カスケード乳剤	4,000倍	7日前まで	2回
プレオフロアブル	1,000倍	7日前まで	2回

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

- ▶優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを!!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

新規登録農薬紹介

兼商 ヨーバル®フロアブル

☆ 幅広い殺虫スペクトル

☆ IRACコード：28(ジアミド系)

アブラムシ類・アオムシ・ハマダラメイト・ヨトウムシ・コガハスモンヨトウ・ネリムシ類・ウバ類・アザミウマ類
灌注・散布 登録

詳しい登録内容はお問い合わせください!!

