



キク編



病害虫注意報 2020年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

涼しくなるとアザミウマの発生が再び増加します！他、病害虫にもご注意ください！

アザミウマ類、ハダニ類は、高温期には暑さによって一旦少なくなります。涼しくなると増えてきます。アザミウマ類が多発すると、ウイルスによるえそ病、茎えそ病の感染リスクも高くなるため注意が必要です。

今月のおすすすめローテーション

! 地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合があります。ご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。 ※…花き類・観葉植物登録

白さび病の出やすい圃場は殺菌剤を定期的に散布することをおすすめします！

時期	対象病害虫	薬剤名	使用量・倍率	使用時期	回数
定植時	白さび病	inochioキクツチャ粒剤	6~9kg/10a (作条土壌混和)	定植時	1回
生育初期	白さび病	ジマンダイセンフロアブル	500~800倍	-	8回
	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類	inochio セイレーンフロアブル	2,000倍	発生初期	3回
消灯時	アザミウマ類・ハダニ類 ハスモンヨトウ・オタバコガ	グレースシア乳剤	2,000倍	発生初期	2回
	アブラムシ類 コナジラミ類	コルト顆粒水和剤※	4,000倍	発生初期	4回
発蕾時	白さび病	inochioオペラフラワー乳剤	2,000倍	発生初期	3回
	アザミウマ類 オタバコガ※ ハモグリバエ類※ ヨトウムシ類※	アフアーム乳剤	1,000倍 (アザミウマ類1,000~ 2,000倍)	発生初期	5回
破蕾時	ハダニ類	ダニコングフロアブル※	2,000倍	発生初期	1回
	アザミウマ類 オタバコガ	プリンスフロアブル	2,000倍	発生初期	5回

おすすめ資材

日差しに負けない根張りのために!!

NEW-SB酸素

- ☆ 土壌に酸素を供給し、根の活動を活発に!
- ☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします!

5~10kg/10a

7~10日おき灌水処理



弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストロブマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



高温対策に! 効果は約1か月

すすみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防!
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10~20錠

