



キャベツ編



病害虫注意報 2020年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ対策

ハスモンヨトウ



- ・成虫は卵塊（数百個）で産卵する
- ・食欲旺盛で酷い食害を起こす
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある

シロイチモジヨトウ



- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み、新葉に入る場合もある
- ・7月以降、フェロモントラップの誘殺量が多い！

2020年7月の愛知県の調査で、田原では平年の**5倍以上**の発生が観察されています。



チョウ目害虫おすすり防除ローテーション

時期	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
9月①	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回
9月②	トルネードエースDF	1,000~2,000倍	7日前まで	2回
9月③	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日まで	2回
9月④	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前まで	2回

その他オススメ薬剤

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数	シロイチモジヨトウ登録
スピノエース顆粒水和剤	2,500~5,000倍	3日前まで	3回	-
アフーム乳剤	1,000~2,000倍	前日まで	3回	-
ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍(散布)	前日まで	3回	○ NEW
コテツフロアブル	2,000倍	前日まで	2回	○
カスケード乳剤	2,000~4,000倍	7日前まで	2回	-
プレオフロアブル	1,000倍	7日前まで	2回	-

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル
1,000倍

10~14日おきに葉面散布

- ▶優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを!!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません

肥料登録 生第83188号

登録拡大農薬紹介

ケンジヤフロアブル

- ◆優れた予防効果
- ◆次世代菌密度低減効果
- ◆SDHI剤耐性菌にも高い効果 FRAC:7(SDHI剤)

菌核病
1,500倍/前日まで
3回以内

使用時期変更情報

ベルコート 水和剤

収穫前日数が短くなりました!

収穫28日前
↓
収穫14日前