



ナス編



病害虫注意報 2020年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

アザミウマ・ハスモンヨトウの発生に注意しましょう！

発見が遅く老令幼虫になると薬剤が効きづらくなるので、初期発生時の防除に努めましょう！



アザミウマ

- ・春～初夏、晩夏～秋口に多発。
- ・慣れると肉眼で観察可能。
- ・細かい目合いのネットでも通過してハウス内に侵入
→しかし、**赤色は壁に見えるので赤色ネットが有効!!**



ハスモンヨトウ

- ・成虫は卵塊（数百個）で産卵
- ・食欲旺盛で集団で食害を起こす
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋
- ・5～6齢幼虫は日中株元へ移動し見つけにくくなる
- ・高温、少雨で多発生

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数		
						ミツバチ	マルハナ	スワスキー
①	コナジラミ類・アザミウマ類 ハダニ類・ハモグリバエ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ チャノホリダニ	アファーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	7日	
	アブラムシ類・アザミウマ類 コナジラミ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍 (コナジラミ類2,000~3,000倍 アブラムシ類3,000倍)	前日	2回	14日	14日以上	-
②	灰色かび病	予 ロブラール500アクア	1,000~1,500倍	前日	4回	1日	7日	
	ハダニ類・チャノホリダニ ミナキイロアザミウマ・オオタバコガ ミンキイロアザミウマ・ヨウムシ テントウムシダマシ類・ハスモンヨトウ	コテツフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	4回	10日	9日	14日
③	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病・黒枯病	予 ベルクートフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	0日	
	アザミウマ類・アブラムシ類 ハダニ類・コナジラミ類 チャノホリダニ	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	30日	20~30日

緑の香り成分で、暑さに負けず生き生き元気!!

すずみどり

- ▷ ハウス内が30~35℃を超える時期に!
- ▷ 香り成分で葉焼けや萎れを予防し光合成向上!
- ▷ 曇天後の快晴時、高温障害が出やすくなる天候が変わりやすい時期に!

ハウス内に吊るすだけ **10a当たり10~20錠**

軟弱徒長株を強く! 0-28-26

エレマックス赤 1,000倍 葉面散布

- ▶ 樹を締めて徒長防止!
- ▶ 花芽分化・着果(花)の向上に!
- ▶ 病気抵抗力の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください ※カテキンパワーとの混用は可能です

登録拡大農薬紹介

ケンジャフロアブル

- ◆優れた予防効果 ◆次世代菌密度低減効果
- ◆SDHI剤耐性菌にも高い効果
- FRAC:7(SDHI剤)

うどんこ病・菌核病・灰色かび病
1,500倍/前日まで/3回以内

※果実の汚れ注意

登録拡大農薬紹介

ピシロックフロアブル

- ★卵菌類由来の病害に対して高い効力!
- ★新規系統で耐性菌にも有効!(FRAC:U17)
- ★優れた予防効果

褐色腐敗病/1,000倍/前日まで/3回以内