



# ブロッコリー編

## 病害虫注意報 2020年10月号

inochio  
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### べと病・黒腐病対策

#### べと病



#### 症状

- ▶葉裏・花蕾などの黒変
- ▶汚白色のかび

#### 多発条件

- ▶連続する降雨
- ▶長時間の植物の濡れ

#### 黒腐病



#### 症状

- ▶葉縁のV字型病斑
- ▶維管束の黒変

#### 多発条件

- ▶低温期の降雨
- ▶虫害の酷い圃場(傷口)

### 今月のおすすめローテーション\*カッパーシン・クプロシールドは花蕾形成期以降は散布不可(薬害)

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
10月①	べと病	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	2回
10月②	黒腐病	予・治 カッパーシン水和剤*	1,000倍	21日前まで	4回
10月③	べと病・黒すす病 菌核病	予・治 シグナムWDG	1,500~2,000倍 (黒すす病・菌核病1,500倍)	7日前まで	2回
10月④	べと病・黒斑細菌病 軟腐病・斑点細菌病	予 クプロシールド*	1,000~2,000倍 (軟腐病1,000~1,500倍)	-	-

### その他おすすめ薬剤

\*フォリオゴールドはダコニール1000と合わせて2回まで

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
べと病	予 ランマンフロアブル	2,000倍	3日前まで	3回
	予 レーバスフロアブル	2,000倍	7日前まで	2回
	予・治 フォリオゴールド※	1,000倍	出蕾前(21日前まで)	2回
べと病・黒すす病	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	3日前まで	3回
黒腐病・黒斑細菌病	予 キノンドー水和剤40	800倍	14日前まで	3回

弱った株の回復に!

### カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!

カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した  
植物活力資材



軟弱徒長株を強く!

### エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

- ▶樹を締めて徒長防止!
- ▶病害抵抗力の向上に!

0-28-26



※石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤液肥、ホルモン剤との混用は避ける。

※カテキンパワーとの混用は可能です