



ハクサイ編

病害虫注意報 2020年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白斑病・べと病・アブラムシ類・チョウ目害虫防除特集

白斑病	感染→発病まで約3～16日 多雨の年に多発
べと病	発生適温は20℃と比較的冷涼で、多湿条件で多発
アブラムシ類	温暖な気候が続くと多発
チョウ目害虫	シロイチモジヨトウが多発 チョウ目害虫全般やや多い

防除の基本は
発生前の
予防散布です！



おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
①	べと病・白さび病 予・治	ピシロックフロアブル	1,000倍	3日前まで	3回
	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前まで	3回
②	黒斑病・白斑病・尻腐病 予	ネクスターフロアブル	1,000倍	7日前まで	3回
	アブラムシ類	ウララDF	2,000～3,000倍	前日	2回
③	白斑病・黒斑病・菌核病 べと病・白さび病・炭疽病 予・治	シグナムWDG	1,500～2,000倍 (菌核病・炭疽病1,500倍)	7日前	3回
	コガ・サザミ・オタバコガ ハマダラメイト・アムシ ハモンヨトウ・ヨトウムシ	グレース乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
④	白さび病・べと病 ピシウム腐敗病 予・治	フォリオゴールド	800～1,000倍 (白さび病・ピシウム腐敗病 1,000倍)	7日前まで	2回
	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前まで	3回

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した
植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号

軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

0-28-26
1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止！
▶ 病害抵抗力の向上に！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録：輸第9423号