



イチゴ編

病害虫注意報 2020年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫が始まる前に定期防除をしっかりと行い 年内の病害虫発生を抑えましょう！



定植後 おすすめローテーション

炭疽病・ダニ対策の薬剤を中心としたローテーションとなっています！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバ	升	マルハナ	ミヤコ
10月①	炭疽病 予・治	ゲッター水和剤	1,000倍	収穫開始 21日前まで	3回	1日			14日
	ハダニ類・チャノホリガニ	ダニトロンフロアブル	1,000~2,000倍 (チャノホリガニ1,000倍)	前日	1回	1日		14日	14日
10月②	うどんこ病・灰色かび病 輪斑病 予	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日			0日
	ハダニ類・ヨトウム オオタバコガ・ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日			7日
10月③	炭疽病・灰色かび病 予	セイビアーフロアブル20	1,000~1,500倍 (炭疽病は1,000倍)	前日	3回	1日	0日		0日
	うどんこ病・ハダニ類 アブラムシ類・コナジラミ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	1日			1日
10月④	炭疽病・灰色かび病 予・治	ファンタジスタ顆粒水和剤 ※コロマイト水和剤との混用は 直前混用のみ使用可能	2,000~3,000倍 (炭疽病は2,000倍)	前日	3回	0日			0日
	ハダニ類・シラメホリガニ	コロマイト水和剤 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日			7日

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

光合成能力UP!

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
★日照不良時の代謝の向上!

肥料登録 生第87201号

活着不良対策に!

ファイトメット

100~150g/10a
または
2,000~3,000倍灌水

▶リン酸・ミネラル分の吸収アップに!
▶毛細根の充実に!

肥料登録 輸第84050号

軟弱徒長株を強く!

エレマックス赤

0-28-26
1,000倍 葉面散布

▶樹を締めて徒長防止!
▶花芽分化・着果(花)の向上に!
▶病気抵抗力の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録 輸第9423号