



キャベツ編

病害虫注意報 2020年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナガ・黒腐病対策

コナガ



黒腐病



被害

薄皮を残した食害 葉脈を残した食害など

症状

葉縁のV字型病斑、維管束の黒変

多発条件

25~30℃の気温 降水量が少ない年

多発条件

低温期の降雨、虫害の酷い圃場(傷口)

今月のおすすめローテーション

チョウ目害虫中心の薬剤になっています。対象害虫や倍率など詳しい内容はラベルの記載をご確認ください。

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
10月①	ハモシヨウ・アムシ オタバコガ など	カスケード乳剤	2,000~4,000倍	7日前まで	2回
	ヨイモジヨウ・コナガ ハモシヨウ など	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000~2,000倍	発生初期 (前日まで)	-
10月②	黒腐病・軟腐病 斑点細菌病・べと病	クプロシールド ※結球期以降散布不可(薬害)	1,000~2,000倍 (軟腐病1,000~1,500倍)	-	-
	ハモシヨウ・アムシ ハマダラメカ など	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回
10月③	ヨウムシ・アザミワ類 ハマダラメカ など	スピノエース顆粒水和剤	2,500~5,000倍 (害虫によって異なります)	3日前まで	3回
	ハモシヨウ・オタバコガ コナガ など	フローバックDF	1,000~2,000倍 (害虫によって異なります)	発生初期 (前日まで)	-
10月④	黒腐病・軟腐病・株腐病	バリダシン液剤 5	800倍	7日前まで	5回
	アブラムシ類・コナガ・ナメジキ類 ハマダラメカ・アムシ	パダンSG水溶剤	1,500倍	14日前まで	4回

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号



軟弱徒長株を強く！

0-28-26

エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止！
▶ 病害抵抗力の向上に！

※石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録：輸第9423号

