



キュウリ編

病害虫注意報 2020年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

定植時・生育初期の防除 定植時おすすめ剤

粒剤は2~3週間効果が持続するので、害虫防除にとっても有効です。
アブラムシ類・コナジラミ類・ミナミキイロアザミウマはウイルス病を媒介します。
ウイルス病は一度感染すると治らないので、害虫の防除を徹底しましょう！
また、物理面から赤色防虫ネットの展張をおすすめします！

	薬剤名	使用量/倍率	使用時期	使用回数	アザミウマ類	コナジラミ類	アブラムシ類	その他
粒剤	ベストガード粒剤	育苗期：1g/株 定植時：1~2g/株	育苗期・定植時	育苗期及び定植時 合わせて1回	○定植時	○	○	-
	アルバリン粒剤	1~2g/株	育苗期・定植時	育苗期及び定植時 合わせて1回	○ 育苗期：x 定植時2g/株	○	○ 育苗期1g/株 定植時1~2g/株	ハダカアザミウマ類○ 2g/株
灌注	ベリマークSC	薬量：25ml/400株 水量：10~20L/400株	育苗期後半~ 定植当日	1回	○	○	○	ハダカアザミウマ類○

定植3~5日前の
処理がおすすめです！

灌注専用剤 **ベリマークSC** + 灌注処理に
プラス！ **ファイトオーツー 1000倍**

同時灌注で効果アップ☆
▶ 暑さによる根痛み防止 ▶ 毛細根の充実
▶ 徒長防止

定植後 おすすめローテーション

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数 スルスルー
①	うどんこ病 菌核病・灰色かび病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ・カメムシ類	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍	前日	3回	7日
②	うどんこ病・褐斑病 炭疽病・灰色かび病	予 ベルコート水和剤	2,000~4,000倍 (褐斑病2,000倍)	前日	7回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類 ハダカアザミウマ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	20~ 30日
③	うどんこ病・コナジラミ類	予 パルミノ	2,000倍	前日	3回	21日
④	黒星病・べと病・うどんこ病 炭疽病・褐斑病・灰色かび病	予 ダコニール1000	1,000倍	前日	8回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	1,000~2,000倍 (アブラムシ類2,000倍)	前日	2回	-

活着不良対策に！
ファイトメット
100~150g/10aまたは
2,000~3,000倍灌水
▶リン酸・ミネラル分の吸収アップに！
▶毛細根の充実に！
肥料登録
輸第84050号

新規登録農薬紹介
ヨーバルフロアブル
兼商
☆ 幅広い殺虫スペクトル
☆ IRACコード：28
アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類
ハダカアザミウマ類・ウリナメガ・ハシモンヨトウ
灌注・散布 登録
詳しい登録内容はお問い合わせください！！

光合成能力UP！
ファイトマジック
1,000倍 葉面散布
キレートマグネシウム
+各種微量元素
★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！
★日照不良時の代謝の向上！
肥料登録
生第87201号