



レタス編

病害虫注意報 2020年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫注意!

ハスモンヨトウ・オオタバコガ

老齢幼虫は薬剤が効きにくく、防除が難しくなります。
定期防除と幼虫を見かけたら早めの防除を心がけましょう!

ハスモンヨトウ幼虫



病害注意!

すす枯病・斑点細菌病

曇天が続いたり、突然の大雨などが多くなります。
病気の発生前にしっかり防除することを心がけましょう!

斑点細菌病



アブラムシ注意!

アブラムシ

秋口に発生することがあります。新芽などをよく観察しましょう!
特に育苗期にアブラムシ剤を使用していない場合は発生に注意!

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	非結球レタス	
定植		①	10日後	②	20日後	③	30日後
①	軟腐病・腐敗病 斑点細菌病	予 キノドーフロアブル	800~1,000倍	21日前まで	5回	30日前まで	
①	ハモグリバエ類・ヨウムシ オタバコガ・ハスモンヨトウ	プレバソフフロアブル5	1,000~2,000倍 (オタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ2,000倍)	前日	3回	2,000倍	
②	菌核病・すす枯病 灰色かび病	予 ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	×	
②	オタバコガ・ハスモンヨトウ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回	○	
③	すす枯病・軟腐病 腐敗病	予・治 バリダシン液剤5	800倍	7日前まで	3回	○	
③	アザミウマ類・ハモグリバエ オタバコガ・ヨウムシ ハスモンヨトウ	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	3日前まで	2回	○	

アブラムシ対策におすすめ!

モベントフロアブル	2,000~4,000倍	7日前まで	3回	14日前まで
トランスフォームフロアブル	2,000倍	前日	3回	○
モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	前日	3回	4,000倍 7日前まで 1回

弱った株の回復に!

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!

カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブチン系、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録:
生第91402号



軟弱徒長株を強く!

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止!

▶ 病害抵抗力の向上に!

◎ 石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録:
輸第9423号