



トマト編

病害虫注意報 2020年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

マルハナバチ導入後のコナジラミ防除



黄化葉巻(TYLCV)



黄化病(ToCV)



タバココナジラミ

コナジラミは黄化葉巻 (TYLCV) だけでなく、新しいウイルス病「黄化病(ToCV)」も媒介します。TY抵抗性品種でもコナジラミ防除を行いましょう！！

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
10月 ①	コナジラミ類・オタバコガ トマトヒゲダニ・ハメグリバエ類	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
10月 ②	コナジラミ類・アザミウマ類 ハモンヨトウ・オタバコガ ハメグリバエ類	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類は2,500倍)	前日	2回	1~3日
10月 ③	アブラムシ類 コナジラミ類・アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3回	1~3日
	うどんこ病・コナジラミ類 アブラムシ類・ハダニ類	フーモン	1,000倍	前日	-	1日
10月 ④	コナジラミ類・トマトヒゲダニ	アプロードエースフロアブル	1,000~2,000倍 (トマトヒゲダニ1,000倍)	前日	3回	1日

★ハチ導入後のチョウ目害虫対策 露地ではチョウ目害虫が発生しています！引き続き注意しましょう！

対象害虫	薬剤名	希釈倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
ハメグリバエ類・オタバコガ	プレバソンフロアブル5	1,000~2,000倍 (オタバコガ2,000倍)	前日	3回	1日
ハモンヨトウ・トマトヒゲダニ アザミウマ類・オタバコガ コナジラミ類・トマトヒゲダニ	グレースシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
オタバコガ・コナジラミ類 トマトヒゲダニ・ハモンヨトウ ミカンイロアザミウマ・ハメグリバエ類	マッチ乳剤	1,000~3,000倍 (害虫によって異なります)	前日	4回	1日

光合成能力UP!
ファイトマジック
1,000倍 葉面散布
キレートマグネシウム
+各種微量元素
★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
★根に活力を与える!



肥料登録 生第87201号

軟弱徒長株を強く! 0-28-26
エレマックス赤
1,000倍 葉面散布
樹を締めて徒長防止!
花芽分化・着果(花)の向上に!
◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録 輸第9423号

弱った株の回復に!
カテキンパワー
1,000倍 葉面散布
※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録 生第91402号