



ブロッコリー編

病害虫注意報 2020年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

花蕾腐敗病・黒すす病 対策



花蕾腐敗病

症状

- ▶ 花蕾が淡褐色～黒褐色に腐敗する

多発条件

- ▶ 激しい降雨
- ▶ 食害などが多い圃場



黒すす病

症状

- ▶ 葉や花蕾に発生
- ▶ 小黑点の症状が広がる

多発条件

- ▶ 多湿条件
- ▶ 前作発生した圃場での栽培

今月のおすすめローテーション

*1 花蕾形成期以降は散布不可(葉害)

*2 シグナムWDGはカンタスドライフロアブルと合わせて2回以内

時期	対象病害	薬剤名	倍率	使用時期	回数
①	黒斑細菌病・べと病 軟腐病・斑点細菌病	予 クプロシールド*1	1,000~2,000倍 (軟腐病1,000~1,500倍)	-	-
②	予・治 黒すす病・べと病	アミスター20フロアブル	2,000倍	3日前	3回
③	軟腐病・黒斑細菌病	予 スターナ水和剤	2,000倍	14日前	2回
④	黒すす病・菌核病 根朽病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回

その他おすすめ薬剤

対象病害	薬剤名	倍率	使用時期	回数
花蕾腐敗病など	予 Zボルドー*1	500倍	-	-
黒腐病	予・治 カッパーシン水和剤*1	1,000倍	21日前	4回
花蕾腐敗病	予・治 マイコシールド	1,000~2,000倍	14日前	2回
黒斑細菌病・軟腐病 花蕾腐敗病	予 マスタピース水和剤	1,000~2,000倍	前日	-
べと病・黒すす病・菌核病	予・治 シグナムWDG*2	1,500倍 (べと病1,500~2,000倍)	7日前	2回

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号



軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

- ▶ 樹を締めて徒長防止！
- ▶ 病害抵抗力の向上に！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録：輸第9423号

