



イチゴ編

病害虫注意報 2020年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

年内の病害虫発生を抑えるために引き続き定期防除を行いましょよう！

スパスパトリオ

スパイカルEX×1 & スパイデックス×3

天敵混用
放飼器付き!!



＜天敵混用放飼器のメリット＞

- ・放飼間隔の距離が短くなるため効果が安定！
- ・より均一に天敵が放飼できます！
- ・従来の約6割の時間で放飼が可能！



☆11月中旬までには天敵を導入し、導入後1～2週間は、薬剤散布や葉かきは控えましょよう！

定植後 おすすめローテーション

薬剤散布前には葉かきを行い、
薬剤のかかりを良くましょよう！

| 時期 | 対象病害虫 | 薬剤名 | 倍率 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|----|------|-----|-----|----|
| | | | | | | ミツバチ | マルハ | ミヤコ | 刊 |
| 11月 ① | 灰色かび病・炭疽病 うどんこ病・黒斑病 | ベルコートフロアブル | 2,000倍 (うどんこ病 2000~4,000倍) | 前日 | 5回 | 0日 | | | 0日 |
| | うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類 | フーモン ※野菜類 登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 1日 | | | 1日 |
| 11月 ② | うどんこ病・灰色かび病 | オルフィンフロアブル | 2,000~3,000倍 | 前日 | 1回 | 1日 | - | | 0日 |
| | ハダニ類 | マイトコーネフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり | 1,000倍 | 前日 | 2回 | 1日 | | | 0日 |
| | うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類 | フーモン ※野菜類 登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 1日 | | | 1日 |
| 11月 ③ | 炭疽病・うどんこ病 | サンリット水和剤 | 2,000~4,000倍 (炭疽病2,000倍) | 前日 | 3回 | 1日 | - | | 0日 |
| | ハダニ類・シクラメンコナジラミ | スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり | 2,000倍 | 前日 | 2回 | 1日 | | | 0日 |
| | ハダニ類 (ハダニの発生が多い時) | ニッソラン水和剤 卵(ハダニ類)にも効果あり | 2,000~3,000倍 | 前日 | 2回 | 1日 | | | 0日 |

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かましょよう！

ミツバチくん応援資材

カモンビービー

こんな時におすすめ！

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量：5~6パック)

※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!



新規登録農薬紹介

ダニオーテフロアブル

- ★ ハダニ類の全ステージに活性を示します。
- ★ 天敵・有用昆虫への影響が少ないです。

ハダニ類 2,000倍 前日まで/2回

※銅剤との混用不可。近接散布に注意。

