



# キャベツ編

病害虫注意報 2020年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## べと病・菌核病 対策

べと病



### 症状

- ▶ 黒褐色の病斑
- ▶ 汚白色のかび

### 多発条件

- ▶ 10~15℃
- ▶ 連続する降雨

菌核病



### 症状

- ▶ 灰褐色の病斑・腐敗
- ▶ ネズミ糞状の菌核

### 多発条件

- ▶ 圃場の排水不良
- ▶ 軟弱徒長

## おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数
①	菌核病・べと病 株腐病・黒斑病 <b>予・治</b>	シグナムWDG	1,500倍 (べと病 1,500~2,000倍)	7日前	2回
②	菌核病・株腐病 <b>予</b>	ロブルール水和剤	1,000倍	7日前	4回
③	べと病・ピシウム腐敗病 <b>予・治</b>	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
④	菌核病 <b>予・治</b>	スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回

## その他おすすめ薬剤

対象病害虫	薬剤名	倍率	時期	回数	
べと病 <b>予</b>	ランマンフロアブル	2,000倍	3日前	4回	
べと病 <b>予</b>	レーバスフロアブル	2,000倍	7日前	3回	
べと病・ピシウム腐敗病 <b>予・治</b>	フォリオゴールド	800~1,000倍 (ピシウム腐敗病1,000倍)	14日前	2回	
菌核病	株腐病 <b>予</b>	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回
	根朽病 <b>予</b>	ネクスターフロアブル	1,000倍	7日前	3回
	黒斑病 根朽病 灰色かび病 <b>予・治</b>	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍 (黒斑病・根朽病2000倍)	3日前	3回

**弱った株の回復に！**

**カテキンパワー**

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

肥料登録：生第91402号

**軟弱徒長株を強く！**

**エレマックス赤**

0-28-26

1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止！  
▶ 病害抵抗力の向上に！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。  
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録：輸第9423号